

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра протидії кіберзлочинності
Факультет №4

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до лабораторних занять
навчальної дисципліни «Вища математика»
вибірковий компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
071 «Облік і оподаткування» (Поліцейські)

Харків 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 30.08.2023 № 7

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 4
Протокол від 16.08.2023 № 8

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 29.08.2023 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4
(протокол від 15.08.2023 №19)

Розробник:

1. *старший викладач кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4
Роз В.Є.*

Рецензенти:

1. *Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», д.т.н., професор Кучук Г.А.*
2. *Професор кафедри кібербезпеки та DATA-технології факультета №6
ХНУВС, доктор технічних наук, професор Можсаєв О.О.*

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Номер та найменування теми	Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни						Література, сторінки	Вид контролю
	Всього	з них:						
		лекції	Семинарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота		
Тема № 1: Матриці та визначники	6	2			2	2	1-4,7-9,15,17-20	
Тема №2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь	6	2			2	2	1-4,7-9,15,17-20	
Тема №3. Вектори	6	2			2	2	1-4,7-9,15,17-20	
Тема № 4 Аналітична геометрія на площині та у просторі	6	2			2	2	1-4,7-9,15,17-20	
Тема № 5 Функція однієї змінної. Границя функції однієї змінної	8	2			2	4	2-6,12-15,17-20	
Тема № 6. Похідна та її обчислення	8	2			2	4	2-6,12-15,17-20	
Тема №7. Диференціальне числення дійсних функцій багатьох змінних	10	2			2	6	2-6,12-15,17-20	
ТЕМА № 8. Інтегральне числення функції однієї змінної	10	2			2	6	2-6,12-15,17-20	
ТЕМА № 9. Диференціальні рівняння	14	2			4	8	2-6,12-15,17-20	
ТЕМА № 10. Ряди	16	2			4	10	2-6,12-15,17-20	
Всього за семестр №1	90	20			24	46		езамен

2. Методичні вказівки до лабораторних занять.

Тема № 1: Матриці та дії з ними. Лабораторне заняття №1.

Навчальна мета заняття : закріплення теоретичних знань з матричної алгебри; вироблення навичок розв'язання задач матричної алгебри за допомогою середовища MathCad; аналіз отриманих результатів.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Поняття матриці.
2. Освоєння дій з матрицями.
3. Види матриць.
4. Відшукування рангу матриці.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.
3. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
4. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.
5. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
6. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Дано матриці A та B та C . Необхідно

1. Розв'язати рівняння $AB+Y=2B$
2. Знайти $A+C^T$, AC , AB , AC^T

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Розв'язання.

1. Розв'яжемо рівняння $AB+Y=2B$. Для цього виразимо Y : $Y=2B-AB$.

Користуючись правилами виконання дій над матрицями, знайдемо:

$$2B = 2 * \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Тоді шуканий розв'язок рівняння:

$$Y = 2B - AB = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

2. Знайдемо матрицю $A+C^T$

$$A + C^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 8 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Знайдемо матрицю AC

$$AC = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2*3 - 1*1 - 3*0 & 2*(-2) - 1*2 - 3*(-1) & 2*5 - 1*(-3) - 3*4 \\ 1*3 - 2*1 - 2*0 & 1*(-2) - 2*2 + 2*(-1) & 1*5 - 2*(-3) + 2*4 \\ 3*3 + 1*1 + 1*0 & 3*(-2) + 1*2 + 1*(-1) & 3*5 + 1*(-3) + 1*4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 1 & -8 & 19 \\ 10 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Матриці AB , AC^T знаходяться аналогічно.

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad C := \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot B = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$Y := 2 \cdot B - A \cdot B$$

$$Y = \begin{pmatrix} 19 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$A + C^T = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 8 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad A \cdot C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 1 & -8 & 19 \\ 10 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C^T = \begin{pmatrix} -7 & 9 & -11 \\ 17 & -9 & 10 \\ 2 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$5. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$6. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$7. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$8. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & -4 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$9. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 9 \\ 8 & 2 & -5 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$10. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 4 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

ТЕМА №2. «Визначники квадратних матриць, методи їх обчислення та властивості».

Лабораторне заняття №2.

Навчальна мета заняття : закріплення теоретичних знань з матричної алгебри;

вироблення навичок розв'язання задач матричної алгебри за допомогою середовища MathCad; аналіз отриманих результатів.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Поняття визначників 2-го та 3-го порядку та їх обчислення.
2. Поняття мінору та алгебраїчного доповнення елементів квадратної матриці

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.
3. Мелащенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелащенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
4. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.
5. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
6. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Обчислити визначник за правилом трикутників.
Розв'язання.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 5 + (-4) \cdot 4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 \cdot 2 - (-4) \cdot 1 \cdot 5 = 30 - 32 + 1 - 6 - 8 + 20 = 5.$$

Приклад 2. Обчислити визначник за правилом Саррюса.

Розв'язання.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 0 + 0(-4) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 \cdot 2 - (-2) \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot (-4) \cdot 2 - 0 \cdot 3 \cdot 0 = -12 + 4 + 8 = 0.$$

Приклад 3. Побудувати матрицю, обернену до матриці $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Розв'язання.

Обчислимо:

$$\Delta(A) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 10 & -5 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 10 & -5 \end{vmatrix} = 15 - 10 = 5. \quad \Delta(A) \neq 0 \quad \text{— обернена}$$

матриця існує.

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 4 & -1 \\ 10 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ 2 & \frac{12}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Переконаємося, що матриця A^{-1} , побудована нами, справді є оберненою до матриці A . Знайдемо AA^{-1} :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ 2 & \frac{12}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 5$$

$$F := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$


$$|F| = 0$$

$$D := \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0.8 & -0.2 \\ 2 & 2.4 & -0.6 \\ 0 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ 2 & \frac{12}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$D \cdot D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$5. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$6. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$7. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$8. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & -4 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$9. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 9 \\ 8 & 2 & -5 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$10. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 4 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема №3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь Лабораторне заняття №3.

Навчальна мета заняття : закріплення теоретичних знань з розв'язання СЛАР;
вироблення навичок розв'язання СЛАР за допомогою середовища MathCad;
аналіз отриманих результатів.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Метод Крамера.
2. Метод Гаусса.
3. Метод оберненої матриці.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.

2. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.
3. Мелащенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелащенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
4. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.
5. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
6. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Розв'язати систему рівнянь методом Крамера:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10, \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 25, \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 17. \end{cases}$$

Розв'язання.

Обчислимо визначник цієї системи:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

Визначник системи відмінний від нуля. Знайдемо тепер визначник $D_k (k = 1, 2, 3)$ і розв'язки системи рівнянь:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 \\ 25 & 6 & 7 \\ 17 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 12, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 10 & 3 \\ 2 & 25 & 7 \\ 1 & 17 & 6 \end{vmatrix} = 8, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 6 & 25 \\ 1 & 4 & 17 \end{vmatrix} = 4;$$

Тоді за формулами Крамера маємо:

$$x_1 = \frac{12}{4} = 3, \quad x_2 = \frac{8}{4} = 2, \quad x_3 = \frac{4}{4} = 1.$$

Приклад 2. Розв'язати систему рівнянь за допомогою оберненої матриці

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7 \end{cases}$$

Розв'язання.

Систему можна записати у матричному вигляді $A \cdot X = B$, де

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Тоді (якщо $\det A \neq 0$) розв'язок системи знаходимо за формулою $X = A^{-1}B$.
Знайдемо матрицю A^{-1} , обернену до A .

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 13 \quad (A^*)^T = \begin{pmatrix} -6 & 4 & 7 \\ 1 & -5 & 1 \\ 8 & -1 & -5 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -6 & 4 & 7 \\ 1 & -5 & 1 \\ 8 & -1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Тоді

$$X = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -6 & 4 & 7 \\ 1 & -5 & 1 \\ 8 & -1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -54 - 8 + 49 \\ 9 + 10 + 7 \\ 72 + 2 - 35 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -13 \\ 26 \\ 39 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

таким чином, розв'язок системи: $x_1 = -1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$.

Приклад 3. Розв'язати методом Гаусса систему рівнянь:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7 \end{cases}$$

Розв'язання.

Складемо розширену матрицю системи та приведемо її до трикутної за допомогою елементарних перетворень.

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 & 7 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & 2 & 2 & 7 \end{array} \right).$$

Від другого рядка матриці віднімемо перший рядок помножений на 2, а від третього рядка віднімемо перший помножений на 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 1 & 13 \\ 0 & 8 & -1 & 13 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1/5 & 13/5 \\ 0 & 8 & -1 & 13 \end{array} \right).$$

Від третього рядка віднімемо другий помножений на 8:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1/5 & 13/5 \\ 0 & 0 & -13/5 & -39/5 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1/5 & 13/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Відповідно запишемо систему:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ x_2 + \frac{1}{5}x_3 = \frac{13}{5} \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

З другого рівняння системи маємо

$$x_2 = \frac{13}{5} - \frac{1}{5}x_3 = \frac{13}{5} - \frac{1}{5} \cdot 3 = 2,$$

а з першого рівняння

$$x_1 = -2 + 2x_2 - x_3 = -2 + 4 - 3 = -1.$$

Отже, розв'язок системи $x_1 = -1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$.

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad

Розв'язати систему рівнянь за допомогою функції Isolve:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10, \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 25, \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 17. \end{cases}$$

Запишемо у матричному вигляді:


$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 10 \\ 25 \\ 17 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 4$$

$$x := A^{-1} \cdot B \quad x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad +$$

$$x := \text{Isolve}(A, B)$$

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Розв'язати систему рівнянь за допомогою методу Гаусса:


$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10, \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 25, \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 17. \end{cases}$$

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 10 \\ 25 \\ 17 \end{pmatrix}$$

ORIGIN := 1

Формування розширеної матриці системи

$$A1 := \text{augment}(A, B) \quad A1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 2 & 6 & 7 & 25 \\ 1 & 4 & 6 & 17 \end{pmatrix}$$



Прямий та обернений ход методу Гаусса

$A2 := \text{rref}(A1)$

$$A2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$x := \text{submatrix}(A2, 1, 3, 4, 4)$

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Перевірка

$$A \cdot x - B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Розв'язати систему рівнянь за допомогою функції Find:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10, \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 25, \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 17. \end{cases}$$

$x1 := 0 \quad x2 := 0 \quad x3 := 0$


Given

$$x1 + 2 \cdot x2 + 3 \cdot x3 = 10$$

$$2 \cdot x1 + 6 \cdot x2 + 7 \cdot x3 = 25$$

$$x1 + 4 \cdot x2 + 6 \cdot x3 = 17$$

$$\text{Find}(x1, x2, x3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Розв'язати систему рівнянь за допомогою методу Крамера:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10, \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 25, \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 17. \end{cases}$$

Файл Правка Вид Вставка Формат Математика Символы Окно ?

Normal Arial 10 B I U

Знаходимо визначник матриці системи

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad \Delta := |A| \quad \Delta = 4$$

Знаходимо допоміжні визначники

$$\Delta_1 := \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 \\ 25 & 6 & 7 \\ 17 & 4 & 6 \end{vmatrix} \quad \Delta_2 := \begin{vmatrix} 1 & 10 & 3 \\ 2 & 25 & 7 \\ 1 & 17 & 6 \end{vmatrix} \quad \Delta_3 := \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 6 & 25 \\ 1 & 4 & 17 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = 12 \quad \Delta_2 = 8 \quad \Delta_3 = 4$$

Знаходимо розв'язок за формулами Крамера

$$x_1 := \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad x_2 := \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad x_3 := \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 1$$

Матрицы

Греческий алфавит

Арифметика

Вычисле...

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

1. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6. \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -3. \end{cases}$
3. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 12, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -9. \end{cases}$
4. $\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -4, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -5. \end{cases}$
5. $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 12, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases}$
6. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -4, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 11, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -7. \end{cases}$
7. $\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 9, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 12. \end{cases}$
8. $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 9, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 11, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 19. \end{cases}$
9. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$
10. $\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 19, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 11, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема №4. Вектори на площині і в просторі та дії з ними.

Лабораторне заняття №4.

Навчальна мета заняття : закріплення теоретичних знань з векторної алгебри; вироблення навичок розв'язання задач векторної алгебри за допомогою середовища MathCad; аналіз отриманих результатів.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Скалярний, векторний та мішаний добуток векторів.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.
3. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
4. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.
5. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
6. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у

журналі групи, 1, 11, 21 – розв’язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв’язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад Знайти скалярний добуток $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$, де $A_1(2, 4, 6)$, $A_2(5, 4, 7)$, $A_3(-4, 8, 7)$.

Розв'язання.

Обчислимо скалярний добуток векторів $\vec{A_1A_2}$, $\vec{A_1A_3}$ та кут між ними.

Розв'язання.

Спочатку знайдемо координати цих векторів. $\vec{A_1A_3}(-4-2, 8-4, 7-6) = \vec{A_1A_3}(-6, 4, 1)$, аналогічно $\vec{A_1A_2}(3, 0, 1)$.

Тоді $\vec{A_1A_2} \cdot \vec{A_1A_3} = 3 \cdot (-6) + 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = -17$.

Знайдемо модуль вектора $\vec{A_1A_3}$:

$$|\vec{A_1A_3}| = \sqrt{(-6)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{53}.$$

Обчислюємо кут між ребрами A_1A_2 та A_1A_3 :

$$\cos \varphi = \frac{-17}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{53}} = -\frac{17}{\sqrt{530}} \approx -0,74,$$

тобто кут дорівнює

$$\varphi = \arccos(-0,74) \approx 138^\circ.$$

Приклад 2. Знайти площу трикутника за координатами його вершин: $A(1; -2; 8)$, $B(0; 0; 4)$, $C(6; 2; 0)$.

Розв'язання.

Розглянемо два вектори, на яких побудовано трикутник, наприклад, $\vec{AB} \perp \vec{AC}$.

$$\vec{AB} = (-1; 2; -4), \vec{AC} = (5; 4; -8).$$

Векторний добуток дорівнює:

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -4 \\ 5 & 4 & -8 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 5 & -8 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} =$$


$$= \vec{i} \cdot (-16 + 16) - \vec{j} \cdot (8 + 20) + \vec{k} \cdot (-4 - 10) = -28\vec{j} - 14\vec{k}.$$

Тоді площа трикутника дорівнює:

$$S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(-28)^2 + (-14)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{5 \cdot 14^2} = 7\sqrt{5} \text{ (кв. од.)}.$$

Приклад 3. Знайти об'єм тетраедра, заданого вершинами $A(2; -1; 0)$, $B(5; 5; 3)$, $C(3; 2; -2)$, $D(4; 1; 2)$.

Розв'язання.



Відомо, що об'єм тетраедра, побудованого на векторах дорівнює шостій частині об'єму паралелепіпеда, побудованого на цих векторах.

Тому маємо

$$V = \frac{1}{6} |\overline{ABACAD}|$$

Знаходимо $\overline{AB} = (3; 6; 3)$, $\overline{AC} = (1; 3; -2)$, $\overline{AD} = (2; 2; 2)$

$$N = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad

Знайти скалярний добуток $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$, де $A_1(2, 4, 6)$, $A_2(5, 4, 7)$, $A_3(-4, 8, 7)$.

$$A1 := \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad A2 := \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \quad A3 := \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$


$$A1A2 := A2 - A1 \quad A1A3 := A3 - A1$$

$$A1A2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A1A3 = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A1A2 \cdot A1A3 = -17$$

$$\phi := \arccos\left(\frac{A1A2 \cdot A1A3}{|A1A2| \cdot |A1A3|}\right)$$

$$\phi = 2.402 \quad \cos(\phi) = -0.738$$



Скалярное произведение *

+

Знайти площу трикутника за координатами його вершин: $A(1; -2; 8)$, $B(0; 0; 4)$, $C(6; 2; 0)$.

— +


$$A := \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad C := \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$AB := B - A$$

$$AC := C - A$$

$$AB = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$$



Векторное произведение Ctrl+8

$$AB \times AC = \begin{pmatrix} 0 \\ -28 \\ -14 \end{pmatrix}$$


$$|AB \times AC| = 31.305$$

$$S := \frac{|AB \times AC|}{2}$$

$$S = 15.652 \quad S \rightarrow 7 \cdot \sqrt{5}$$

Знайти об'єм тетраедра, заданого вершинами $A(2;-1;0)$, $B(5;5;3)$, $C(3;2;-2)$, $D(4;1;2)$.

$$AB := \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \quad AC := \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad AD := \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$



$$(AB \times AC) \cdot AD = -18$$

$$V := \frac{|(AB \times AC) \cdot AD|}{6} \quad V \rightarrow 3$$

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Задано точки $A(k;-1;2)$, $B(1;k;-1)$, $C(-k;1;-3)$, $D(3;-5;k)$.

Знайти:

а). $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$, б). $\vec{AC} \times \vec{AB}$, в). $\cos(\vec{AB} \wedge \vec{AC})$, д). $\sin(\vec{AB} \wedge \vec{AC})$,

е) площу трикутника ACD , ж) об'єм тетраедра $ABCD$ та довжину висоти тетраедра, яка опущена з вершини D (k -номер здобувача вищої освіти по списку у журналі групи).

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема № 5 Аналітична геометрія на площині.

Лабораторне заняття №5.

Навчальна мета заняття : закріплення теоретичних знань з аналітичної геометрії на площині; вироблення навичок розв'язання задач аналітичної геометрії на площині за допомогою середовища MathCad; аналіз отриманих результатів.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Рівняння прямої на площині.
2. Кут між двома прямими.
3. Умова паралельності та перпендикулярності прямих.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.
3. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
4. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.
5. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
6. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Вершини трикутника знаходяться в точках $A_1(2, 3)$, $A_2(5, 4)$, $A_3(9, 1)$.

Скласти:

1. Рівняння прямої A_1A_2 .

Розв'язання.

Рівняння прямої A_1A_2 запишемо як рівняння прямої, що проходить через дві задані точки:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}, \text{ де } A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), \text{ тобто } \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{1} \text{ або } y = \frac{1}{3}x + 2\frac{1}{3} - \text{рівняння}$$

прямої A_1A_2 .

2. Рівняння висоти та медіани цього трикутника, опущених з вершини A_2 .

Розв'язання.

Запишемо рівняння прямої A_1A_3 як рівняння прямої, що проходить через дві задані точки:

$$\frac{x-2}{7} = \frac{y-3}{-2} \text{ або } y = -\frac{2}{7}x + 3\frac{4}{7} - \text{рівняння прямої } A_1A_3.$$

Для знаходження рівняння висоти A_2D трикутника використаємо умову перпендикулярності прямих

$$k_1 = -\frac{1}{k_2},$$

де k_1 та k_2 – кутові коефіцієнти висоти A_2D та прямої A_1A_3 відповідно.

Оскільки кутовий коефіцієнт прямої A_1A_3 – $k_2 = -\frac{2}{7}$, то кутовий коефіцієнт висоти

$$k_1 = \frac{7}{2} = 3,5.$$

Тепер можемо записати рівняння висоти A_2D як рівняння прямої з заданим кутовим коефіцієнтом:

$$y = k_1x + b,$$

$$\text{тобто } y = 3,5x + b.$$

Оскільки точка A_2 належить висоті A_2D , її координати повинні задовольняти рівняння висоти, тобто

$$4 = 3,5 \cdot 5 + b \text{ або } b = -13,5.$$

Отже, рівняння висоти A_2D має вигляд

$$y = 3,5x - 13,5.$$

Дано координати вершин трикутника ABC. Застосувавши методи аналітичної геометрії, знайти:

- а) рівняння та кутові коефіцієнти прямих AB і AC;
- б) рівняння висоти CD та її довжину;
- в) рівняння медіани BK;
- г) рівняння прямої, що проходить через точку B паралельно до прямої AC.
- д) побудувати трикутник ABC та висоту CD.

- 1. A(11; -5), B(-1; 4), C(15; 17).
- 2. A(14; -4), B(2; 5), C(18; 18).
- 3. A(8; 1), B(-4; 10), C(12; 23).
- 4. A(13; -9), B(1; 0), C(17; 13).
- 5. A(3; -3), B(-9; 6), C(7; 19).
- 6. A(12; -7), B(0; 2), C(16; 15).
- 7. A(2; 0), B(-10; 9), C(6; 22).
- 8. A(0; -10), B(-12; -1), C(4; 12).
- 9. A(7; -2), B(-5; 7), C(11; 20).
- 10. A(4; -12), B(-8; -3), C(8; 10).

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема № 6. Функція однієї змінної. Границя функції однієї змінної. Лабораторне заняття №6.

Навчальна мета заняття : вироблення у студентів навичок обчислення границь за допомогою середовища MathCad.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

- 1. Границя функції та її властивості.
- 2. Розкриття невизначеностей.
- 3. Дві особливі границі.
- 4. Застосування нескінченно малих величин при обчисленні границь.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

- 1. Конспект лекцій.
- 2. Мелащенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелащенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
- 3. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. – М.: Рольф, 2002. – 288 с., с ил.

4. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
5. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Обчислити границі, не використовуючи правило Лопітала:

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + x - 1}{x - 3x^2 + 2}.$$

Розв'язання.

У даній границі маємо невизначеність $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$, причому степені чисельника й знаменника рівні між собою. Для обчислення цієї границі й у чисельнику, і в знаменнику винесемо x^2 за дужку. В результаті одержуємо

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(7 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(\frac{1}{x} - 3 + \frac{2}{x^2} \right)}.$$

Доданки $\frac{1}{x}$; $-\frac{1}{x^2}$; $\frac{2}{x^2}$ прямують до нуля при $x \rightarrow \infty$. Т.ч. дужка в чисельнику прямує до 7 при $x \rightarrow \infty$, а дужка в знаменнику прямує до -3 при $x \rightarrow \infty$. У результаті маємо

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + x - 1}{x - 3x^2 + 2} = -\frac{7}{3}.$$

$$б) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 8x + 12}{x^2 - 4}.$$

Розв'язання.

Маємо невизначеність $\left[\frac{0}{0} \right]$. При обчисленні цієї границі необхідно чисельник і знаменник розкласти на множники.

Знаменника запишемо у вигляді $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Для розкладання чисельника знайдемо коріння рівняння $x^2 - 8x + 12 = 0$,

$$D = (-8)^2 - 4 \cdot 12 = 16, \quad x_1 = \frac{8+4}{2} = 6; \quad x_2 = \frac{8-4}{2} = 2.$$

Використовуючи формулу $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, одержуємо $x^2 - 8x + 12 = (x - 6)(x - 2)$.

Таким чином, вихідна межа можна записати у вигляді $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 6)(x - 2)}{(x + 2)(x - 2)}$.

Скоротивши на $(x - 2)$, одержуємо $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 6}{x + 2}$.

Ця межа вже не має невизначеностей. Підставляючи $x = 2$, одержуємо, що вихідна межа рівна -1 .

$$в) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 8}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{6 - x}}.$$

Розв'язання.

Аналогічно прикладу б) розкладемо квадратний тричлен $x^2 + 2x - 8$ на множники, а саме,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 4)}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{6 - x}}.$$

Для перетворення знаменника домножимо і чисельник, і знаменник дробу на спряжене до знаменника, тобто на $\sqrt{x + 2} + \sqrt{6 - x}$ та скористаємося формулою скороченого множення $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 4)(\sqrt{x + 2} + \sqrt{6 - x})}{(\sqrt{x + 2} - \sqrt{6 - x})(\sqrt{x + 2} + \sqrt{6 - x})} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 4)(\sqrt{x + 2} + \sqrt{6 - x})}{(\sqrt{x + 2})^2 - (\sqrt{6 - x})^2} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 4)(\sqrt{x + 2} + \sqrt{6 - x})}{x + 2 - (6 - x)} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+4)(\sqrt{x+2} + \sqrt{6-x})}{2(x-2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+4)(\sqrt{x+2} + \sqrt{6-x})}{2} = 12$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-5} \right)^{6x-5}.$$

Розв'язання.

При обчисленні цієї межі скористаємося наслідком другої чудової границі, а саме,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

Приведемо дану границю до виду:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-5} \right)^{6x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x+2}{3x-5} - 1 \right)^{6x-5} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x+2-(3x-5)}{3x-5} \right)^{6x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{3x-5} \right)^{6x-5} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x-5}{7}} \right)^{6x-5}.$$

Для застосування наслідку другої чудової границі необхідно, що знаменник дробу, що знаходиться в дужках (у нашому випадку $\frac{3x-5}{7}$) і степінь (у нашому випадку $6x-5$) були рівні між собою. Доб'ємося виконання цієї умови:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x-5}{7}} \right)^{6x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x-5}{7}} \right)^{\frac{3x-5}{7} \cdot \frac{7}{3x-5} \cdot (6x-5)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{\frac{3x-5}{7}} \right)^{\frac{3x-5}{7}} \right)^{\frac{7(6x-5)}{3x-5}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{42x-35}{3x-5}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{42x-35}{3x-5}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x(42-35/x)}{x(3-5/x)}} = e^{14}.$$

Обчислемо

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\arcsin 3x \cdot \ln(1-2x)}.$$

Розв'язання.

У цьому прикладі будемо користуватися наслідком першої й другої чудових границь, а саме,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\frac{\arcsin 3x}{3x} \cdot 3x \cdot \ln(1 - 2x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x \cdot \ln(1 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x \cdot \ln(1 + (-2x))} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x \cdot \frac{\ln(1 + (-2x))}{-2x} \cdot (-2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x \cdot (-2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{-6x^2} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2} \cdot \frac{(2x)^2}{-6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{4x^2}{-6x^2} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Приклад 2. Дослідити функцію $f(x)$ на неперервність, встановити тип точок розриву, якщо вони є, схематично побудувати графік, якщо

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < -1; \\ -2x, & -1 \leq x \leq 0; \\ 3, & x > 0. \end{cases}$$

Розв'язання.

Функції $y_1(x) = x^2 + 1$, $y_2(x) = -2x$, $y_3(x) = 3$ неперервні при $x \in (-\infty; +\infty)$. Тому $f(x)$ може мати точки розриву лише при $x = -1$, $x = 0$. Перевіримо виконання умови неперервності в цих точках.

При $x = -1$ маємо:

1. $f(x)$ визначена при $x = -1$, причому $f(-1) = -2 \cdot (-1) = 2$.
2. $A = \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} (x^2 + 1) = (-1)^2 + 1 = 2$,
 $B = \lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} (-2x) = -2 \cdot (-1) = 2$.

Ми отримали, що односторонні границі A і B існують та скінченні.

3. $A = B = f(x_0)$.

Усі умови неперервності виконані, т.ч. $x = -1$ - точка неперервності функцію $f(x)$.

При $x = 0$ маємо:


1. $f(x)$ визначена при $x = 0$, причому $f(0) = -2 \cdot 0 = 0$.
2. $A = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} (-2x) = 0$,
 $B = \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} 3 = 3$.

Односторонні границі A і B існують та скінченні.

3. $A \neq B$.

Ми з'ясували, що односторонні границі існують та скінченні, але не дорівнюють одна одній. Таким чином, $x = 0$ є точка розриву першого роду, неусувного розриву.

Схематично графік функції $f(x)$ має вигляд




Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad.


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 \cdot x^2 + x - 1}{x - 3 \cdot x^2 + 2} \rightarrow \frac{-7}{3} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 8 \cdot x + 12}{x^2 - 4} \rightarrow -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2 \cdot x - 8}{\sqrt{x+2} + (-\sqrt{6-x})} \rightarrow 12 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3 \cdot x + 2}{3 \cdot x - 5} \right)^{6 \cdot x - 5} \rightarrow \exp(14)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2 \cdot x)}{\sin(3 \cdot x) \cdot \ln(1 - 2 \cdot x)} \rightarrow \frac{-1}{3}$$

+





Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Вычислить пределы, не используя правило Лопиталя:

1. а) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + 6x - 1}{3 - x^2 + 2}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2\sqrt{x}}{x^2 + 4x - 5}$;

г) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{\frac{1}{x}}$;

д) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{\sin 4x}$.

2. а) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - x - 1}{3x^2 + 2}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4x - 12}{x^2 - 4}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x}}{x^2 - x - 2}$;

г) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{3x}$;

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \cdot \operatorname{tg} x}.$$

$$3. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - x^2 - 1}{x + x^2};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x^2 + 7x};$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{\sin 6x}.$$

$$4. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 6x - 1}{x^3 - x^2 + 1};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} + \sqrt{6-x}}{x^2 + 4x - 12};$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\arcsin x}.$$

$$5. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 2x^2 - 2x}{x^2 + x + 1};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x^2 + x - 2};$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{\operatorname{arctg} \frac{x}{3}}.$$

$$6. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x - 1}{5 - 6x^3 + 2x};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x} - \sqrt{6-x}}{x^2 + 2x - 8};$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 4^x}{\operatorname{arctg} x}.$$

$$7. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1 - x^2}{3 - x + 2x^2};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x^2 + 4x - 5};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 2x - 8};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + x^2}{x^2} \right)^{2x^2 - 1};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 6x + 5}{x^2 - 1};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x + 4}{3x - 2} \right)^{5x + 1};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + x - 20}{x^2 - 16};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x + 3}{7x - 2} \right)^{4x - 1};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x - 1}{3x + 7} \right)^{3-x};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 16};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x^2 - 4} \right)^{3x^2 + 1};$$

$$д) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 6x}{\ln(1 + 2x)}.$$

$$8. а) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - x + 2}{x - x^3};$$

$$в) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 + x - 2};$$

$$д) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_3(1 - x)}{\sin 2x}.$$

$$9. а) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 6x};$$

$$в) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x^2 + x - 12};$$

$$д) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\ln(1 - 6x)}.$$

$$10. а) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{3 - x^2};$$

$$в) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x} - \sqrt{x + 2}}{x^2 + x - 6};$$

$$д) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{\sin 5x}.$$

$$б) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4};$$

$$г) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7 + 2x}{6 + 2x} \right)^{3x-1};$$

$$б) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 5x + 4};$$

$$г) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} \right)^{2x+1};$$

$$б) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 9};$$

$$г) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x - 1}{3x + 6} \right)^{x+2};$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема №7. Похідна функції, її практичний зміст і правила диференціювання Лабораторне заняття №7.

Навчальна мета заняття : вироблення у студентів навичок обчислення похідних за допомогою середовища MathCad, закріплення теоретичних знань з диференціального числення.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Знаходження похідних функцій.

2. Похідна складної функції.
3. Похідна неявної функції та параметрично заданої функції.
4. Правило Лопіталя.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Варіанти завдань та методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Ч. 1. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 50 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993
4. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. – М.: Рольф, 2002. – 288 с., с ил.
6. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
7. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Знайти похідну y' : $y = \frac{7x^3 - 4x + 1}{\sqrt{1 - 4x}}$

Розв'язання.

$$\begin{aligned}
y' &= \left(\frac{7x^3 - 4x + 1}{\sqrt{1-4x}} \right)' = \\
&= \frac{(7x^3 - 4x + 1)' \cdot \sqrt{1-4x} - (7x^3 - 4x + 1)(\sqrt{1-4x})'}{(\sqrt{1-4x})^2} = \\
&= \frac{(21x^2 - 4) \cdot \sqrt{1-4x} - (7x^3 - 4x + 1) \cdot \frac{(1-4x)'}{2\sqrt{1-4x}}}{1-4x} = \\
&= \frac{(21x^2 - 4) \cdot \sqrt{1-4x} - (7x^3 - 4x + 1) \cdot \frac{-4}{2\sqrt{1-4x}}}{1-4x} = \\
&= \frac{(21x^2 - 4) \cdot (1-4x) + 2(7x^3 - 4x + 1)}{(1-4x)^{3/2}}.
\end{aligned}$$

Приклад 2. Знайти похідну y' : $y = \cos 3 \cdot \ln(2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}})$

Розв'язання.

$$\begin{aligned}
y' &= (\cos 3 \cdot \ln(2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}))' = \cos 3 (\ln(2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}))' = \\
&= \cos 3 \cdot \frac{(2 + e^x \sqrt[3]{1+4e^{3x}})'}{2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}} = \cos 3 \cdot \frac{(e^x)' \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}} + e^x (\sqrt[3]{1+4e^{3x}})'}{2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}} = \\
&= \cos 3 \cdot \frac{e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}} + e^x \cdot \frac{1}{3} (1+4e^{3x})^{-2/3} (1+4e^{3x})'}{2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}} = \\
&= \cos 3 \cdot \frac{e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}} + e^x \cdot \frac{1}{3} (1+4e^{3x})^{-2/3} \cdot 4e^{3x} \cdot (3x)'}{2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}} = \\
&= \cos 3 \cdot \frac{e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}} + 4e^{4x} (1+4e^{3x})^{-2/3}}{2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1+4e^{3x}}}.
\end{aligned}$$

Приклад 3. Знайти похідну y'_x : $\begin{cases} y = \cos t, \\ x = t^2 + t + 1. \end{cases}$

Розв'язання.

$$\text{Так як } \begin{cases} y'_t = -\sin t, \\ x'_t = 2t + 1, \end{cases} \quad \text{то} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = -\frac{\sin t}{2t + 1}.$$

Приклад 4. Знайти похідну. Записати диференціал dy , якщо

$$y = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{x}}.$$

Розв'язання.

Так як

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{x}} \right)^2} \cdot \frac{(\sqrt{1-x})(1-\sqrt{x}) - \sqrt{1-x}(1-\sqrt{x})}{(1-\sqrt{x})^2} = \frac{-\frac{1-\sqrt{x}}{2\sqrt{1-x}} + \frac{\sqrt{1-x}}{2\sqrt{x}}}{1 - 2\sqrt{x} + x + 1 - x} = \\ &= \frac{-(1-\sqrt{x}) \cdot \sqrt{x} + 1-x}{2\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{x} \cdot 2(1-\sqrt{x})} = \frac{-\sqrt{x} + x + 1 - x}{4\sqrt{x-x^2}(1-\sqrt{x})} = \frac{1}{4\sqrt{x-x^2}}, \end{aligned}$$

то диференціал $dy = \frac{1}{4\sqrt{x-x^2}} dx$.

Приклад 5. Використовуючи метод логарифмічного диференціювання, знайти похідну функції

$$y = \sqrt[5]{\frac{(x+1)^4}{2x+3}} \cdot \frac{x^2+x+1}{(x-3)^7}$$

Розв'язання.

Прологарифмуємо даний вираз та скористаємося властивостями логарифму.

$$\ln y = \frac{4}{5} \ln(x+1) - \frac{1}{5} \ln(2x+3) + \ln(x^2+x+1) - 7 \ln(x-3).$$

Знайдемо похідну по x , вважаючи, що $y = y(x)$. Маємо

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot y' &= \frac{4}{5(x+1)} - \frac{2}{5(2x+3)} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{7}{x-3}. \\ y' &= y \left(\frac{4}{5(x+1)} - \frac{2}{5(2x+3)} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{7}{x-3} \right) = \\ &= \sqrt[5]{\frac{(x+1)^4}{2x+3}} \cdot \frac{x^2+x+1}{(x-3)^7} \cdot \left(\frac{4}{5(x+1)} - \frac{2}{5(2x+3)} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{7}{x-3} \right). \end{aligned}$$

Приклад 6. Знайти похідну y'_x функції, задану параметрично:

$$x = \arcsin \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad y = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad t \in (-\infty; +\infty).$$

Розв'язання.

Так як

$$x'(t) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{t^2}{1+t^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1+t^2} - t \cdot \frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}{1+t^2} = \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{1+t^2},$$

$$y'(t) = \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{1+t^2}}} \cdot \frac{-\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}{1+t^2} = \sqrt{\frac{1+t^2}{t^2}} \cdot \frac{t}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2}} = \frac{\operatorname{sgn} t}{1+t^2},$$

то $y'_x = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \operatorname{sgn} t.$

Приклад 7. Обчислити $y'(x_0)$ для функції $y(x)$, що задовільняє рівнянню $3x^4 - y^5 + 2xy = 0$, якщо $x_0 = -1$.

Розв'язання.

Продиференціюємо обидві частини данної рівності, враховуючи, що y є функція від x : $12x^3 - 5y^4 y' + 2(y + x \cdot y') = 0$.

З отриманої рівності виразимо y' :

$$y'(2x - 5y^4) = -12x^3 - 2y,$$

$$y' = \frac{12x^3 + 2y}{5y^4 - 2x}.$$

Для знаходження y_0 , підставимо в данне рівняння $x = x_0 = -1$:

$$3 - y^5 - 2y = 0.$$

Так як зліва - монотонна функція, то рівняння може мати не більше одного рішення. Очевидно, це $y_0 = 1$.

Тоді $y'(-1) = \frac{-12 + 2}{5 + 2} = -\frac{10}{7}.$

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad.

$$y(x) := \frac{7 \cdot x^3 - 4 \cdot x + 1}{\sqrt{1 - 4 \cdot x}}$$


$$\frac{d}{dx} y(x) \rightarrow \frac{(21 \cdot x^2 - 4) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)}{(1 - 4 \cdot x)^{\left(\frac{1}{2}\right)}} + 2 \cdot \frac{(7 \cdot x^3 - 4 \cdot x + 1)}{(1 - 4 \cdot x)^{\left(\frac{3}{2}\right)}}$$

$$y := \cos(3) \cdot \ln\left(2 + e^x \cdot \sqrt[3]{1 + 4 \cdot e^{3 \cdot x}}\right)$$

$$\frac{d}{dx} y \rightarrow \cos(3) \cdot \frac{\left[\exp(x) \cdot (1 + 4 \cdot \exp(3 \cdot x))^{\left(\frac{1}{3}\right)} + 4 \cdot \frac{\exp(x)}{(1 + 4 \cdot \exp(3 \cdot x))^{\left(\frac{2}{3}\right)}} \cdot \exp(3 \cdot x) \right]}{\left[2 + \exp(x) \cdot (1 + 4 \cdot \exp(3 \cdot x))^{\left(\frac{1}{3}\right)} \right]}$$

$$y(t) := \cos(t) \quad x(t) := t^2 + t + 1$$

$$y1(t) := \frac{\frac{d}{dt} y(t)}{\frac{d}{dt} x(t)} \quad y1(t) \rightarrow \frac{-\sin(t)}{(2 \cdot t + 1)}$$



Символьная

→	▪→	Modifiers
float	rectangular	assume
solve	simplify	substitute
factor	expand	coeffs
collect	series	parfrac
fourier	laplace	ztrans
invfourier	invlaplace	invztrans
m ^T →	m ⁻¹ →	m →
explicit	combine	confrac
rewrite		

Исчисление

$\frac{d}{dx}$	$\frac{d^n}{dx^n}$	∞	\int_a^b
$\sum_{n=1}^{\infty}$	$\prod_{n=1}^{\infty}$	\int	\sum_n
\prod_n	$\lim_{n \rightarrow a^+}$	$\lim_{n \rightarrow a^-}$	$\lim_{n \rightarrow a}$
$\nabla_x f$			

Вычисл...

=	:=	≡
→	↦	f x
x f	x f y	x ^f y

Калькулятор

sin	cos	tan	ln	log
n!	i	x	√	°
e ^x	$\frac{1}{x}$	()	x ²	x ^y
π	7	8	9	/
$\frac{1}{x}$	4	5	6	×
÷	1	2	3	+
:=	.	0	-	=

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Знайти похідну:

а) $y = \frac{2(3x^2 + 4x^2 - x - 2)}{15\sqrt{1+x}}$; б) $y = \ln(2 + e^x + 2\sqrt{e^{2x} + e^x + 1})$;

в) $y = \sqrt{x} \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+7})$; г) $y = \arctg \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x}{\sqrt{2}}$;

д) $y = (x^2 + 8)\sqrt{x^2 - 4} + \frac{x^4}{16} \arcsin \frac{2}{x}$.

2. а) $y = \frac{x^4 - 8x^2}{2(x^2 - 4)}$;

б) $y = e^{2x} (2 - \sin 2x - \cos 2x)$;

в) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 25})$;

г) $y = \frac{2x-1}{4} \cdot \arcsin \frac{2x-11}{3}$;

д) $y = \ln(1 + \sqrt{1 - e^{4x}}) - e^{-2x} \cdot \arcsin e^{2x}$.

3. а) $y = \frac{(1+x^8) \cdot \sqrt{1+x^8}}{12x^{12}}$;

б) $y = \frac{1}{2} \arctg \frac{3^x - 3}{2}$;

в) $y = 2\sqrt{x} - 4\ln^2(2 + \sqrt{x})$;

г) $y = \arccos \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 16}}$;

$$\text{д) } y = \frac{2\sqrt{2x - x^2}}{x - 1} + \ln \frac{1 + \sqrt{2x - x^2}}{x - 1}.$$

$$4. \text{ а) } y = \frac{(x^6 - 2)\sqrt{(4 + x^2)^3}}{120x^5}; \quad \text{б) } y = 2\sqrt{e^x + 1} + \ln \frac{\sqrt{e^x + 1} - 1}{\sqrt{e^x + 1} + 1};$$

$$\text{в) } y = \sqrt{\ln(\sqrt{x} + \sqrt{x + 1})}; \quad \text{г) } y = \frac{1}{4} \ln(x - 1) \cdot \operatorname{arctg} x;$$

$$\text{д) } y = \operatorname{arctg} \frac{3x - 1}{\sqrt{2}} + \frac{3x - 1}{3x^2 - 2x + 1}.$$

$$5. \text{ а) } y = \frac{4 + 3x^3}{x \cdot \sqrt[3]{(2 + x^3)^2}}; \quad \text{б) } y = \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) - 2 \operatorname{arctg} e^x;$$

$$\text{в) } y = \ln^2(x + \cos x); \quad \text{г) } y = \frac{(1 + x) \operatorname{arctg} \sqrt{x}}{x^2};$$

$$\text{д) } y = \ln(4x - \sqrt{16x^2 - 8x + 2} \cdot \operatorname{arctg}(4x - 1)).$$

$$6. \text{ а) } y = \frac{x^6 + x^3 - 2}{\sqrt{1 - x^3}}; \quad \text{б) } y = \frac{1}{\ln 4} \cdot \ln \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x};$$

$$\text{в) } y = \ln \left(\frac{x^2}{1 - x^2} \right); \quad \text{г) } y = \frac{1 + x^2}{2x} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x};$$

$$\text{д) } y = (2x + 4)^4 \cdot \arcsin \frac{1}{2x + 3}.$$

$$7. \text{ а) } y = \frac{1 + x^2}{2\sqrt{1 + 2x^2}}; \quad \text{б) } y = \frac{2}{3} \sqrt{(\operatorname{arctg} e^x)^3};$$

$$\text{в) } y = \ln \sqrt[4]{\frac{1 + 2x}{1 - 2x}}; \quad \text{г) } y = \frac{4 + x^4}{x^3} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x^2}{2};$$

$$\text{д) } y = \ln(1 + \sqrt{1 - e^{10x}}) \cdot \arcsin e^{5x}.$$

$$8. \text{ а) } y = \frac{\sqrt{(1 + x^2)^3}}{3x^3}; \quad \text{б) } y = \ln(e^x + 1) + \frac{18e^{2x} + 27e^x + 11}{6(e^x + 1)^3};$$

$$\text{в) } y = \ln \sin \frac{2x + 4}{x}; \quad \text{г) } y = \sqrt{\frac{1}{x^2 + 1}} \cdot \arccos x;$$

$$\text{д) } y = \sqrt{-3 + 4x - x^2} \cdot \ln \frac{1 + \sqrt{-3 + 4x - x^2}}{2 - x}.$$

$$9. \text{ а) } y = \frac{\sqrt{2x+3}(x-2)}{x^2}; \quad \text{б) } y = 2(\sqrt{2^x-1} - \arctg \sqrt{2^x-1});$$

$$\text{в) } y = \log_4 \log_2 \text{tg} x; \quad \text{г) } y = \frac{2}{x-3} \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{2}-1};$$

$$\text{д) } y = \sqrt{9x^2 - 12x + 3} \cdot \arcsin \frac{1}{3x-2}.$$

$$10. \text{ а) } y = \frac{(2x^2+3)\sqrt{x^2-3}}{9x^3}; \quad \text{б) } y = 2 \cdot \frac{\ln(\sqrt{1+e^x}-1)}{\ln(\sqrt{1+e^x}+1)};$$

$$\text{в) } y = \ln \cos \frac{2x+3}{3x+2}; \quad \text{г) } y = \frac{2\sqrt{1-x} \cdot \arcsin \sqrt{x}}{x};$$

$$\text{д) } y = \frac{\arctg\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right)}{x^2 - 2x + 3}.$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Лабораторне заняття №8.

Навчальна мета заняття : вироблення у студентів навичок застосування похідних до дослідження функції та побудови її графіка за допомогою середовища MathCad.

Кількість годин - 2.

Місце проведення – комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Дослідження функції та побудова її графіка.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Варіанти завдань та методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Ч. 1. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 50 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993

4. Мелащенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелащенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. – М.: Рольф, 2002. – 288 с., с ил.
6. Сборник задач по высшей математике. 1 часть / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее образование).
7. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану
- 8.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.


Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв'язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Дослідити функцію та побудувати її графік $y = \frac{x^2}{x-3}$.

1. Область визначення функції : $x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$.
2. $y(-x) = \frac{(-x)^2}{-x-3} = -\frac{x^2}{x+3}$. Дана функція не є ні парною, ні непарною, ні періодичною.
3. При $x = 0$, $y = 0$. Графік проходить через початок координат.
4. Знаходимо :

$$y' = \left(\frac{x^2}{x-3} \right)' = \frac{2x(x-3) - x^2}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x}{(x-3)^2}.$$

$$\frac{x^2 - 6x}{(x-3)^2} = 0; \quad x_1 = 0; \quad x_2 = 6; \quad x_3 = 3 - \text{критичні точки}$$



$$y(0) = 0; \quad y(6) = 12 \quad (0; 0) - \max, \quad (6; 12) - \min$$

5. Знаходимо

$$\begin{aligned} y'' &= \left(\frac{x^2 - 6x}{(x-3)^2} \right)' = \frac{(2x-6)(x-3)^2 - 2 \cdot (x-3)(x^2 - 6x)}{(x-3)^4} = \\ &= 2 \cdot \frac{x^2 - 6x + 9 - x^2 + 6x}{(x-3)^3} = \frac{18}{(x-3)^3}. \end{aligned}$$

Друга похідна в нуль не перетворюється і зазнає розриву при $x = 3$. У проміжку $(-\infty; 3)$ маємо $y'' < 0$, тобто в цьому проміжку крива опукла вгору; в проміжку $(3; +\infty)$ маємо $y'' > 0$, тобто в цьому проміжку крива опукла вниз. Точок перегину немає.

6. Знайдемо асимптоти графіка функції.

Оскільки $\lim_{x \rightarrow 3 \pm 0} f(x) = \pm \infty$, то пряма $x = 3$ є вертикальною асимптотою.


Знаходимо похилу асимптоту :

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x^2}{x(x-3)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - k \cdot x) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(\frac{x^2}{x-3} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{3x}{x-3} = 3.$$



Пряма $y = x + 3$ є похилою асимптотою графіка.

7. На основі знайдених даних будуємо графік функції



Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad.

$$y(x) := \frac{x^2}{x-3}$$



1. Область визначення функції: $x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$.
2. $y(-x) = \frac{(-x)^2}{-x-3} = -\frac{x^2}{x+3}$. Дана функція не є ні парною, ні непарною, ні періодичною.
3. При $x = 0$, $y = 0$. Графік проходить через початок координат.
4. Знаходимо :

$$y1(x) := \frac{d}{dx} y(x)$$

$$y1(x) \rightarrow 2 \cdot \frac{x}{(x-3)} - \frac{x^2}{(x-3)^2}$$

$$y1(x) = 0 \text{ solve, } x \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$y1(-1) = 0.437$$

$$y1(4) = -8$$

$$y1(1) = -1.25$$

$$y1(7) = 0.438$$

$$x_{min} := 0$$



$$y(x_{min}) = 0$$

5. Знаходимо

$$y2(x) := \frac{d}{dx} y1(x)$$

$$y2(x) \rightarrow \frac{2}{(x-3)} - 4 \cdot \frac{x}{(x-3)^2} + 2 \cdot \frac{x^2}{(x-3)^3}$$

$$y2(x) = 0 \text{ solve, } x \rightarrow$$



Друга похідна в нуль не перетворюється і зазнає розриву при $x = 3$. У проміжку $(-\infty; 3)$ маємо $y'' < 0$, тобто в цьому проміжку крива опукла вгору; в проміжку $(3; +\infty)$ маємо $y'' > 0$, тобто в цьому проміжку крива опукла вниз. Точок перегину немає.

6. Знайдемо асимптоти графіка функції.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} y(x) \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} y(x) \rightarrow -\infty$$

Оскільки $\lim_{x \rightarrow 3 \pm 0} f(x) = \pm \infty$, то пряма $x = 3$ є вертикальною асимптотою.


Знаходимо похилу асимптоту :

$$k(x) := \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x}$$

$$k(x) \rightarrow 1$$

$$b(x) := \lim_{x \rightarrow \infty} (y(x) - k(x) \cdot x)$$


$$b(x) \rightarrow 3$$



Пряма $y = x + 3$ є похилою асимптотою графіка.

$$y_{as}(x) := x + 3$$

7. На основі знайдених даних будуюмо графік функції



Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Дослідити функцію та побудувати її графік.

Варіант завдання.

$$1. \text{ а) } y = 3x^3 - 9x^2 + 5x + 1 \quad \text{б) } y = \frac{4}{x^2 + 2x - 3}$$

$$2. \text{ а) } y = x^3 - 6x^2 - 15x + 20 \quad \text{б) } y = \frac{1-x}{x+1}$$

$$3. \text{ а) } y = x^3 - \frac{15}{2}x^2 - 12x + \frac{37}{2} \quad \text{б) } y = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$4. \text{ а) } y = x^3 - 24x^2 + 23 \quad \text{б) } y = \frac{1+x}{x^3 + 1}$$

$$5. \text{ а) } y = x^3 + 3x^2 - 9x - 2 \quad \text{б) } y = \frac{4x^2}{x^2 + 3}$$

$$6. \text{ а) } y = x^3 + 6x^2 + 9x - 50 \quad \text{б) } y = \frac{-8x}{x^2 + 4}$$

$$7. \text{ а) } y = x^3 + 9x^2 + 15x + 2 \quad \text{б) } y = \frac{x^3}{3-x^2}$$

$$8. \text{ а) } y = x^3 - 12x - 9 \quad \text{б) } y = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$9. \text{ а) } y = 3x^3 - 9x^2 - 21x + 164 \quad \text{б) } y = \frac{4}{x^2 + 2x - 3}$$

$$10. \text{ а) } y = x^3 + 9x^2 - 48x - 56 \quad \text{б) } y = \frac{x+1}{x^2 + 1}$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Тема № 8. Частинні похідні і повний диференціал функції кількох змінних. Лабораторне заняття №9.

Навчальна мета заняття: опанувати навичками дослідження функцій багатьох змінних за допомогою середовища Mathcad; закріплення теоретичних знань за темою.

Кількість годин – 2.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Частинні похідні першого та другого порядку.
2. Повний диференціал функції двох змінних.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993
4. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану
6. Вища математика. Лабораторний практикум / І. В. Ветлугіна, К. М. Дубовик, М. В. Кайдаш, Є. Ю. Місюра, Є. В. Рєзнік, Т. В. Сілічова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 224 с.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати

прикладі самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи, 1, 11, 21 – розв’язують варіант 1 і т.д.). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв’язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Знайти частинні похідні першого та другого порядків функції $z(x, y) = e^{x^3 y} + 2xy$, переконавшись, що змішанні частинні похідні другого порядку $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ та $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ рівні.
Розв’язання.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= (e^{x^3 y} + 2xy)'_x = 3x^2 y * e^{x^3 y} + 2y \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= (e^{x^3 y} + 2xy)'_y = x^3 * e^{x^3 y} + 2x \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= (3x^2 y * e^{x^3 y} + 2y)'_x = 6xy * e^{x^3 y} + 3x^2 y * 3x^2 y * e^{x^3 y} \\ &= 6xy * e^{x^3 y} + 9x^4 y^2 * e^{x^3 y} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= (x^3 * e^{x^3 y} + 2x)'_y = x^3 * x^3 * e^{x^3 y} = x^6 * e^{x^3 y} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= (3x^2 y * e^{x^3 y} + 2y)'_y = 3x^2 * e^{x^3 y} + 3x^5 y * e^{x^3 y} + 2 \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= (x^3 * e^{x^3 y} + 2x)'_x = 3x^2 * e^{x^3 y} + 3x^5 y * e^{x^3 y} + 2\end{aligned}$$

Приклад 2. Знайти повний диференціал функції $z = \ln(x^2 + y^2)$
Розв’язання.

Знайдемо частинні похідні функції $\frac{\partial z}{\partial x}$ і $\frac{\partial z}{\partial y}$ та підставимо їх у вираз $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \left(\ln(x^2 + y^2) \right)'_x = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2)'_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \left(\ln(x^2 + y^2) \right)'_y = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2)'_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}, \\ dz &= \frac{2x}{x^2 + y^2} dx + \frac{2y}{x^2 + y^2} dy\end{aligned}$$

Приклад 3. Знайти $\frac{\partial z}{\partial x}$ і $\frac{\partial z}{\partial y}$, якщо $x^3 y - 2y^2 + 3z^2 - y \cos z + 7 = 0$.

Розв'язання.

Позначимо $F(x, y, z) = x^3y - 2y^2 + 3z^2 - y \cos z + 7$.

Знайдемо частинні похідні:

$$F'_x(x, y, z) = 3x^2y, \quad F'_y(x, y, z) = x^3 - 4y - \cos z, \quad F'_z(x, y, z) = 6z + y \sin z.$$

За формулами $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}:$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2y}{6z + y \sin z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^3 - 4y - \cos z}{6z + y \sin z}.$$

Приклад 3. Знайти du и d^2u для функції $u = 2x^3y + y^3$.

Розв'язання.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 6x^2y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^3 + 3y^2;$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = 6x^2ydx + (2x^3 + 3y^2)dy.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 12xy, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 6x^2.$$

$$d^2u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}dy^2 = 12xydx^2 + 12x^2dxdy + 6ydy^2.$$

Приклад 4. Знайти всі частинні похідні другого порядку функції $u = 2x^2y - 3xyz^4 + z^2$. Знайти $z''_{xy}(1; -1; 2)$.

Розв'язання.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 4xy - 3yz^4, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2 - 3xz^4, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -12xyz^3 + 2z,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (4xy - 3yz^4) = 4y;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (2x^2 - 3xz^4)'_y = 0;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = (-12xyz^3 + 2z)'_z = -36xyz^2 + 2;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (4xy - 3yz^4) = 4x - 3z^4;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = (2x^2 - 3xz^4)'_x = 4x - 3z^4;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = (4xy - 3yz^4)'_z = -12yz^3;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) = (-12xyz^3 + 2z)'_x = -12yz^3;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = (2x^2 - 3xz^4)'_z = -12xz^3;$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) = (-12xyz^3 + 2z)'_y = -12xz^3;$$

$$u''_{xy}(1; -1; 2) = 4 - 3 \cdot 2^4 = 4 - 48 = -44.$$

Приклад виконання завдання за допомогою Mathcad

Частинні похідні першого та другого порядків від функції

$$z(x, y) := e^{x^3 \cdot y} + 2 \cdot x \cdot y$$

$$\frac{d}{dx} z(x, y) \rightarrow 3 \cdot x^2 \cdot y \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 2 \cdot y$$

$$\frac{d}{dy} z(x, y) \rightarrow x^3 \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 2 \cdot x$$

$$\frac{d^2}{dx^2} z(x, y) \rightarrow 6 \cdot x \cdot y \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 9 \cdot x^4 \cdot y^2 \cdot \exp(x^3 \cdot y)$$

$$\frac{d^2}{dy^2} z(x, y) \rightarrow x^6 \cdot \exp(x^3 \cdot y)$$

Перевіримо, що змішанні частинні похідні другого порядку $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ та $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ рівні.

$$z(x, y) := e^{x^3 \cdot y} + 2 \cdot x \cdot y$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dy} z(x, y) \right) \rightarrow 3 \cdot x^2 \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 3 \cdot x^5 \cdot y \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 2$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{d}{dx} z(x, y) \right) \rightarrow 3 \cdot x^2 \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 3 \cdot x^5 \cdot y \cdot \exp(x^3 \cdot y) + 2$$

$$z(x, y) := \ln(x^2 + y^2)$$

$$Zx(x, y) := \frac{d}{dx} z(x, y) \rightarrow 2 \cdot \frac{x}{(x^2 + y^2)} \quad Zy(x, y) := \frac{d}{dy} z(x, y) \rightarrow 2 \cdot \frac{y}{(x^2 + y^2)}$$

$$dz := 2 \cdot \frac{x \cdot dx}{(x^2 + y^2)} + 2 \cdot \frac{y \cdot dy}{(x^2 + y^2)}$$




+

$$F(x, y, z) := x^3 \cdot y - 2 \cdot y^2 + 3 \cdot z^2 - y \cdot \cos(z)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z) = 3 \cdot x^2 \cdot y \quad \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z) \rightarrow 3 \cdot x^2 \cdot y \quad \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z) \rightarrow 3 \cdot x^2 \cdot y$$

$$Zx(x, y, z) := \frac{-\frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z)}{\frac{\partial}{\partial z} F(x, y, z)} \quad Zx(x, y, z) \rightarrow -\frac{3 \cdot x^2 \cdot y}{6 \cdot z + y \cdot \sin(z)}$$

$$Zy(x, y, z) := \frac{-\frac{\partial}{\partial y} F(x, y, z)}{\frac{\partial}{\partial z} F(x, y, z)} \quad Zy(x, y, z) \rightarrow \frac{4 \cdot y - x^3 + \cos(z)}{6 \cdot z + y \cdot \sin(z)}$$



$$u(x, y) := 2 \cdot x^3 \cdot y + y^3$$

$$u_x(x, y) := \frac{d}{dx} u(x, y) \rightarrow 6 \cdot x^2 \cdot y \quad u_y(x, y) := \frac{d}{dy} u(x, y) \rightarrow 2 \cdot x^3 + 3 \cdot y^2$$

$$du(x, y) := u_x(x, y) \cdot dx + u_y(x, y) \cdot dy$$

$$du(x, y) \rightarrow dy \cdot (2 \cdot x^3 + 3 \cdot y^2) + 6 \cdot dx \cdot x^2 \cdot y$$

$$u_{2xy}(x, y) := \frac{d}{dy} \left(\frac{d}{dx} u(x, y) \right) \rightarrow 6 \cdot x^2$$

$$u_{2x}(x, y) := \frac{d}{dx} u_x(x, y) \rightarrow 12 \cdot x \cdot y \quad u_{2y}(x, y) := \frac{d}{dy} u_y(x, y) \rightarrow 6 \cdot y$$

$$d^2u(x, y) := u_{2x}(x, y) \cdot dx^2 + 2 \cdot u_{2xy}(x, y) \cdot dx \cdot dy + u_{2y}(x, y) \cdot dy^2$$

$$d^2u(x, y) \rightarrow 12 \cdot y \cdot dx^2 \cdot x + 12 \cdot dx \cdot dy \cdot x^2 + 6 \cdot y \cdot dy^2$$

$$u(x, y, z) := 2 \cdot x^2 \cdot y - 3 \cdot x \cdot y \cdot z^4 + z^2$$

$$u_z(x, y, z) := \frac{d}{dz} u(x, y, z) \rightarrow 2 \cdot z - 12 \cdot x \cdot y \cdot z^3$$

$$u_x(x, y, z) := \frac{d}{dx} u(x, y, z) \rightarrow 4 \cdot x \cdot y - 3 \cdot y \cdot z^4 \quad u_y(x, y, z) := \frac{d}{dy} u(x, y, z) \rightarrow 2 \cdot x^2 - 3 \cdot x \cdot z^4$$

$$u_{2z}(x, y, z) := \frac{d}{dz} u_z(x, y, z) \rightarrow 2 - 36 \cdot x \cdot y \cdot z^2$$

$$u_{2x}(x, y, z) := \frac{d}{dx} u_x(x, y, z) \rightarrow 4 \cdot y \quad u_{2y}(x, y, z) := \frac{d}{dy} u_y(x, y, z) \rightarrow 0$$

$$u_{2xy}(x, y, z) := \frac{d}{dy} \left(\frac{d}{dx} u(x, y, z) \right) \rightarrow 4 \cdot x - 3 \cdot z^4$$

$$u_{2xz}(x, y, z) := \frac{d}{dz} \left(\frac{d}{dx} u(x, y, z) \right) \rightarrow -12 \cdot y \cdot z^3$$

$$u_{2zy}(x, y, z) := \frac{d}{dz} \left(\frac{d}{dy} u(x, y, z) \right) \rightarrow -12 \cdot x \cdot z^3$$

+

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Знайти частинні похідні першого та другого порядків функції $z = f(x, y)$ та переконатися, що змішанні частинні похідні другого порядку $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ та $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ рівні.

Знайти повний диференціал функції.

1. $z = 2x^3y - 4xy^5$;

2. $z = x^2 y \sin x - 3y$;
3. $z = \arctg x + \sqrt{y}$;
4. $z = \arcsin(xy) - 3xy^2$;
5. $z = 5xy^4 + 2x^2 y^7$;
6. $z = \cos(x^2 - y^2) + x^3$;
7. $z = \ln(3x^2 - 2y^2)$;
8. $z = 5xy^2 - 3x^3 y^4$;
9. $z = \arcsin(x + y)$;
10. $z = \arctg(2x - y)$;

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

ТЕМА № 9. Екстремум функції двох змінних.

Лабораторне заняття №10.

Навчальна мета заняття: вироблення у здобувачів вищої освіти навичок дослідження функцій багатьох змінних за допомогою середовища Mathcad; закріплення теоретичних знань за темою.

Кількість годин – 2.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Локальний та умовний екстремум функції двох змінних.
2. Найменше та найбільше значення функції в замкненій області.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993
4. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану
6. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. — М.: Рольф, 2002. — 288 с., с ил.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Знайти точки екстремума функції

$$u = z^3 - x^2 - 3y^2 - \frac{3}{2}z^2 - 4x + 6y + 2.$$

Розв'язання.

Знайдемо стаціонарні точки функції: $\frac{\partial u}{\partial x} = -2x - 4$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -6y + 6$,

$\frac{\partial u}{\partial z} = 3z^2 - 3z$. Розв'яжемо систему рівнянь

$$\begin{cases} -2x - 4 = 0, \\ -6y + 6 = 0, \\ 3z^2 - 3z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x = -2, \\ y = 1, \\ z = 0, \quad z = 1. \end{cases}$$

Отримали дві стаціонарні точки: $M_1(-2; 1; 0)$ и $M_2(-2; 1; 1)$. Перевіримо, чи є вони точками екстремума.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -6, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 6z - 3, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = 0.$$

$$\Delta_1(x; y; z) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -2, \quad \Delta_2(x; y; z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} = 12,$$

$$\Delta_3(x; y; z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 6z-3 \end{vmatrix} = 36(2z-1).$$

$$\Delta_1(M_1) = -2 < 0, \quad \Delta_2(M_1) = 12 > 0, \quad \Delta_3(M_1) = -36 < 0.$$

Тобто, $M_1(-2; 1; 0)$ є точкою максимуму.

$\Delta_1(M_2) = -2 < 0, \quad \Delta_2(M_2) = 12 > 0, \quad \Delta_3(M_2) = 36 > 0$, тобто $M_2(-2; 1; 1)$ не є точкою екстремума.

Приклад 2. Знайти умовний екстремум функції $u = x^2 + 2y^2 - 3xy + 3x - 6y + 2$ за умови $x + y - 3 = 0$.

Розв'язання. Складемо функцію Лагранжа

$$L(x; y; \lambda) = x^2 + 2y^2 - 3xy + 3x - 6y + 2 + \lambda(x + y - 3).$$

Знайдемо стаціонарні точки цієї функції

$$L'_x = 2x - 3y + 3 + \lambda, \quad L'_y = 4y - 3x - 6 + \lambda, \quad L'_\lambda = x + y - 3.$$

Розв'яжемо систему рівнянь

$$\begin{cases} 2x - 3y + 3 + \lambda = 0, \\ 4y - 3x - 6 + \lambda = 0, \\ x + y - 3 = 0. \end{cases}$$


Отримали $x_0 = 1, \quad y_0 = 2, \quad \lambda_0 = 1$. Маємо $\varphi'_x \equiv \varphi'_y \equiv 1, \quad L''_{xx}(1; 2; 1) = 2, \quad L''_{xy}(1; 2; 1) = -3, \quad L''_{yy}(1; 2; 1) = 4$.

$$\Delta(1; 2; 1) = \left(L''_{xx}(\varphi'_y)^2 - 2L''_{xy} \cdot \varphi'_x \cdot \varphi'_y + L''_{yy}(\varphi'_x)^2 \right) \Big|_{(1; 2; 1)} =$$

$$= 2 - 2(-3) + 4 = 12 > 0, \text{ тобто } M(1; 2) \text{ є точкою умовного максимуму.}$$

Приклад 3. Визначити найбільше і найменше значення функції $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ в області $x \leq 0, \quad y \leq 0, \quad x + y \geq -3$.

Зазначена область є трикутником.



1) Знайдемо стаціонарні точки: $z'_x = 2x - y + 1$, $z'_y = 2y - x + 1$, $\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases}$.

Розв'язуючи систему, знаходимо $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$. Точка $M(-1; -1)$ належить області.

У точці M значення функції $z(M) = -1$. Дослідження на екстремум не є обов'язковим.

2) Досліджуємо функцію на межі області.

Якщо $x = 0$, то $z = y^2 + y$ і задача зводиться до знаходження найбільшого і найменшого значень цієї функції одного аргументу на відрізку $-3 \leq y \leq 0$.

Похідна функції: $z' = (y^2 + y)' = 2y + 1$. Знаходимо критичні точки з умови $z' = 0$: $2y + 1 = 0$, $y = -\frac{1}{2}$. Ця точка належить відрізку $[-3, 0]$. Знаходимо значення функції:

$$z\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}, \quad z(-3) = (-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6, \quad z(0) = 0 + 0 = 0.$$

При $y = 0$ маємо $z = x^2 + x$. Аналогічно проводимо дослідження на найбільше і найменше значення цієї функції одного аргументу на відрізку $-3 \leq x \leq 0$.

$$z' = (x^2 + x)' = 2x + 1.$$

$$z' = 0: 2x + 1 = 0, \quad x = -\frac{1}{2} \in [-3, 0].$$

$$z\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4},$$

$$z(-3) = (-3)^2 - 3 = 6,$$

$$z(0) = 0 + 0 = 0.$$

При $x + y = -3$, або $y = -3 - x$ маємо функцію $z = x^2 + (-3 - x)^2 - x \cdot (-3 - x) + x + (-3 - x) = 3x^2 + 9x + 6$ на відрізку $-3 \leq x \leq 0$.

Дослідження проводимо аналогічно попередньому.

$$z' = (3x^2 + 9x + 6)' = 6x + 9.$$

$$z' = 0: 6x + 9 = 0, \quad x = -\frac{3}{2} \in [-3, 0].$$

$$z\left(-\frac{3}{2}\right) = 3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 9 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + 6 = -\frac{3}{4},$$

$$z(-3) = 3 \cdot (-3)^2 + 9 \cdot (-3) + 6 = 6,$$

$$z(0) = 0 + 0 + 6 = 6.$$

3) Порівнюємо всі знайдені значення функції z . Робимо висновок, що $z_{\text{найб.}} = 6$ у точках $(0; -3)$ і $(-3; 0)$; $z_{\text{найм.}} = -1$ у стаціонарній точці $M(-1; -1)$.

Приклад виконання завдання за допомогою середовища Mathcad

Знайти екстремуми функції:

$$u(x, y, z) := z^3 - x^2 - 3 \cdot y^2 - 1.5 \cdot z^2 - 4 \cdot x + 6 \cdot y + 2$$

$$u_x(x, y, z) := \frac{\partial}{\partial x} u(x, y, z) \rightarrow -2 \cdot x - 4$$

$$u_y(x, y, z) := \frac{\partial}{\partial y} u(x, y, z) \rightarrow 6 - 6 \cdot y$$

$$u_z(x, y, z) := \frac{\partial}{\partial z} u(x, y, z) \rightarrow -3 \cdot z + 3 \cdot z^2$$

Given

$$u_x(x, y, z) = 0$$

$$u_y(x, y, z) = 0$$

$$u_z(x, y, z) = 0$$

$$\text{Find}(x, y, z) \rightarrow \begin{pmatrix} -2.0 & -2.0 \\ 1.0 & 1.0 \\ 0 & 1.0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ll} x1 := -2 & x2 := -2 \\ y1 := 1 & y2 := 1 \\ z1 := 0 & z2 := 1 \end{array}$$

$$u_{2z}(x, y, z) := \frac{d}{dz} u_z(x, y, z) \rightarrow 6 \cdot z - 3.0$$

$$u_{2x}(x, y, z) := \frac{d}{dx} u_x(x, y, z) \rightarrow -2$$

$$u_{2y}(x, y, z) := \frac{d}{dy} u_y(x, y, z) \rightarrow -6$$

$$u_{2xy}(x, y, z) := \frac{d}{dy} \left(\frac{d}{dx} u(x, y, z) \right) \rightarrow 0$$

$$u_{2xz}(x, y, z) := \frac{d}{dz} \left(\frac{d}{dx} u(x, y, z) \right) \rightarrow 0$$

$$u_{2zy}(x, y, z) := \frac{d}{dz} \left(\frac{d}{dy} u(x, y, z) \right) \rightarrow 0$$

$$\Delta 1(x, y, z) := u_{2x}(x, y, z) \quad \Delta 1(x, y, z) \rightarrow -2$$

$$\Delta 2(x, y, z) := \left| \begin{pmatrix} u_{2x}(x, y, z) & u_{2xy}(x, y, z) \\ u_{2xy}(x, y, z) & u_{2y}(x, y, z) \end{pmatrix} \right| \rightarrow 12$$

$$\Delta 3(x, y, z) := \left| \begin{pmatrix} u_{2x}(x, y, z) & u_{2xy}(x, y, z) & u_{2xz}(x, y, z) \\ u_{2xy}(x, y, z) & u_{2y}(x, y, z) & u_{2zy}(x, y, z) \\ u_{2xz}(x, y, z) & u_{2zy}(x, y, z) & u_{2z}(x, y, z) \end{pmatrix} \right|$$

$$\Delta 3(x, y, z) \rightarrow 72.0 \cdot z - 36.0 \quad \Delta 1(x_1, y_1, z_1) = -2 \quad \Delta 1(x_2, y_2, z_2) = -2$$

$$\Delta 3(x_1, y_1, z_1) = -36 \quad \Delta 3(x_2, y_2, z_2) = 36 \quad \Delta 2(x_1, y_1, z_1) = 12 \quad \Delta 2(x_2, y_2, z_2) = 12$$

M1 - точка максимума

$$u(x, y) := x^2 + 2 \cdot y^2 - 3 \cdot x \cdot y + 3 \cdot x - 6 \cdot y + 2 \quad g(x, y) := x + y - 3$$

$$F(x, y, \lambda) := u(x, y) + \lambda \cdot g(x, y)$$

$$F_x(x, y, \lambda) := \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, \lambda) \rightarrow \lambda + 2 \cdot x - 3 \cdot y + 3$$

$$F_y(x, y, \lambda) := \frac{\partial}{\partial y} F(x, y, \lambda) \rightarrow \lambda - 3 \cdot x + 4 \cdot y - 6$$

$$F_\lambda(x, y, \lambda) := \frac{\partial}{\partial \lambda} F(x, y, \lambda) \rightarrow x + y - 3$$

Given

$$F_x(x, y, \lambda) = 0$$

$$F_y(x, y, \lambda) = 0$$

$$F_\lambda(x, y, \lambda) = 0$$

$$\text{Find}(x, y, \lambda) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} g(x, y) \rightarrow 1 \quad \frac{\partial}{\partial y} g(x, y) \rightarrow 1$$

$$F_{xx}(x, y, \lambda) := \frac{d}{dx} F_x(x, y, \lambda) \rightarrow 2 \quad F_{xy}(x, y, \lambda) := \frac{d}{dy} F_x(x, y, \lambda) \rightarrow -3$$

$$F_{yy}(x, y, \lambda) := \frac{d}{dy} F_y(x, y, \lambda) \rightarrow 4$$

$$\Delta(x, y, \lambda) := F_{xx}(x, y, \lambda) - 2 \cdot F_{xy}(x, y, \lambda) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} g(x, y) \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y} g(x, y) \right) + F_{yy}(x, y, \lambda) \rightarrow 12$$

Тобто $M(1, 2)$ – точка максимуму

$$z(x, y) := x^2 + y^2 - x \cdot y + x + y \quad x \leq 0 \quad y \leq 0 \quad x + y \geq -3$$

1) Знайдемо стаціонарні точки

Given

$$\frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial y} z(x, y) = 0$$

$$\text{Find}(x, y) \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad M(1, 1)$$

2) Досліджуємо функцію на межі області.
Якщо $x = 0$

$$z(y) := y^2 + y$$

$$\frac{d}{dy} z(y) = 0 \text{ solve, } y \rightarrow -\frac{1}{2}$$

$$z(-0.5) = -0.25$$

$$z(-3) = 6$$

$$z(0) = 0$$

При $y=0$ маємо

$$z(x) := x^2 + x \quad \frac{d}{dx} z(x) = 0 \text{ solve, } x \rightarrow -\frac{1}{2}$$

$$z(-0.5) = -0.25$$

$$z(-3) = 6$$

$$z(0) = 0$$

При $x+y=-3$, або $y=-3-x$ маємо функцію

$$z(x) := 3 \cdot x^2 + 9 \cdot x + 6$$

$$\frac{d}{dx} z(x) = 0 \text{ solve, } x \rightarrow -\frac{3}{2}$$

$$z\left(-\frac{3}{2}\right) = -0.75 \quad z(0) = 6 \quad z(-3) = 6$$

Порівнюємо всі знайдені значення функції z . Робимо висновок, що $z_{\text{найб.}} = 6$ у точках $(0; -3)$ і $(-3; 0)$; $z_{\text{найм.}} = -1$ у стаціонарній точці $M(-1; -1)$.

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Дослідити на екстремум:

1. $z = y\sqrt{x} - 2y^2 - x + 14y$.
2. $z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 5$.
3. $z = 1 + 15x - 2x^2 - xy - 2y^2$.
4. $z = 1 + 6x - x^2 - xy - y^2$.
5. $z = x^3 + y^2 - 6xy - 39x + 18y + 20$.
6. $z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5$.
7. $z = 3x^3 + 3y^3 - 9xy + 10$.
8. $z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$.
9. $z = 4(x - y) - x^2 - y^2$.
10. $z = 6(x - y) - 3x^2 - 3y^2$.

Знайти найбільше та найменше значення функції $z = f(x, y)$ в області D , що обмежена заданими лініями.

1. $z = 3x + y - xy$, $D: y = x, y = 4, x = 0$.
2. $z = xy - x - 2y$, $D: x = 3, y = x, y = 0$.
3. $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$, $D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 2$.
4. $z = 5x^2 - 3xy + y^2$, $D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$.
5. $z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x$, $D: x - y + 1 = 0, x = 3, y = 0$.
6. $z = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 8$, $D: x = 0, y = 0, x + y - 1 = 0$.
7. $z = 2x^3 - xy^2 + y^2$, $D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 6$.
8. $z = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2$, $D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$.

$$9. z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x - 1, D: x = 0, y = 0, x + y - 3 = 0.$$

$$10. z = x^2 + 2xy - 10, D: y = 0, y = x^2 - 4.$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

ТЕМА № 10. Інтегральне числення функції однієї змінної.

Навчальна мета заняття: вироблення у здобувачів вищої освіти навичок знаходження невизначених інтегралів за допомогою середовища Mathcad; закріплення теоретичних знань за темою.

Лабораторне заняття №11-12.

Кількість годин – 4.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Метод зведення до табличних на основі незалежності його від вибору змінної інтегрування.
2. Метод підстановки,
3. Метод інтегрування частинами.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993
4. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. $\int \frac{dx}{9-x^2}$.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{9-x^2} &= \int \frac{dx}{-(x^2-4)} = -\int \frac{dx}{x^2-3^2} = -\frac{1}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C = \\ &= -\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C\end{aligned}$$

Приклад 2. $\int (4x^3 + 5 \cos x) dx$.

$$\begin{aligned}\int (4x^3 + 5 \cos x) dx &= \int 4x^3 dx + \int 5 \cos x dx = 4 \int x^3 dx + 5 \int \cos x dx . \\ \int (4x^3 + 5 \cos x) dx &= 4 \frac{x^4}{4} + 5 \sin x + C = x^4 + 5 \sin x + C .\end{aligned}$$

Приклад 3. $\int \left(4x - \frac{5}{x^2} + \frac{3^x}{2} \right) dx$.

$$\begin{aligned}\int \left(4x - \frac{5}{x^2} + \frac{3^x}{2} \right) dx &= \int 4x dx - \int 5x^{-2} dx + \int \frac{1}{2} 3^x dx = \\ &= 4 \int x dx - 5 \int x^{-2} dx + \frac{1}{2} \int 3^x dx = 4 \frac{x^2}{2} - 5 \frac{x^{-1}}{-1} + \frac{1}{2} 3^x \ln 3 + C = \\ &= 2x^2 + \frac{5}{x} + \frac{3^x \ln 3}{2} + C .\end{aligned}$$

Приклад 4. Знайти невизначений інтеграл, результат перевірити диференціюванням: $\int e^{3-4x} dx$.

Розв'язання.

Нехай $3 - 4x = t$, продиференціюємо обидві частини рівняння

$$d(3 - 4x) = dt, \quad (3 - 4x)' dx = dt, \quad -4dx = dt, \quad dx = -\frac{1}{4} dt.$$

отримаємо

$$\int e^{3-4x} dx = \int e^t \left(-\frac{1}{4} dt \right) = -\frac{1}{4} \int e^t dt = -\frac{1}{4} e^t + C = -\frac{1}{4} e^{3-4x} + C.$$

Перевірка:

$$\left(-\frac{1}{4} e^{3-4x} + C \right)' = -\frac{1}{4} (e^{3-4x})' = -\frac{1}{4} \cdot e^{3-4x} (3-4x)' =$$

$$= -\frac{1}{4}e^{3-4x}(-4) = e^{3-4x}$$

Приклад 5. Знайти невизначений інтеграл, результат перевірити диференціюванням: $\int \frac{2^{\arcsin x} + x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Розв'язання.

$$\int \frac{2^{\arcsin x} + x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{2^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Для першого інтеграла введемо заміну змінної $\arcsin x = t$, $d(\arcsin x) = dt$, $(\arcsin x)' dx = dt$, $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = dt$.

Тоді

$$\int \frac{2^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int 2^t dt = \frac{2^t}{\ln 2} + C = \frac{2^{\arcsin x}}{\ln 2} + C_1.$$

Для другого інтеграла $1-x^2 = t$, $d(1-x^2) = dt$, $(1-x^2)' dx = dt$, $-2x dx = dt$, $x dx = -\frac{1}{2} dt$, тоді

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{-\frac{1}{2} dt}{\sqrt{t}} = -\frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{2} \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C_2 =$$

$$= -t^{\frac{1}{2}} + C_2 = -\sqrt{t} + C_2 = -\sqrt{1-x^2} + C_2.$$

В результаті ми отримали

$$\int \frac{2^{\arcsin x} + x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2^{\arcsin x}}{\ln 2} - \sqrt{1-x^2} + C.$$

Перевірка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2^{\arcsin x}}{\ln 2} - \sqrt{1-x^2} + C \right)' &= \frac{2^{\arcsin x} \cdot \ln 2 \cdot (\arcsin x)'}{\ln 2} - \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (1-x^2)' = \\ &= \frac{2^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{2^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2^{\arcsin x} + x}{\sqrt{1-x^2}} - \text{верно}. \end{aligned}$$

Приклад 6. Знайти невизначений інтеграл, результат перевірити диференціюванням: $\int (3^x + 2^x)^2 dx$.

Розв'язання.

$$\begin{aligned}\int (3^x + 2^x)^2 dx &= \int ((3^x)^2 + 2 \cdot 3^x \cdot 2^x + (2^x)^2) dx = \\&= \int (9^x + 2 \cdot 6^x + 4^x) dx = \int 9^x dx + 2 \int 6^x dx + \int 4^x dx = \\&= \frac{9^x}{\ln 9} + 2 \cdot \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{4^x}{\ln 4} + C.\end{aligned}$$

Перевірка:

$$\begin{aligned}\left(\frac{9^x}{\ln 9} + 2 \cdot \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{4^x}{\ln 4} + C \right)' &= \frac{9^x \cdot \ln 9}{\ln 9} + 2 \cdot \frac{6^x \cdot \ln 6}{\ln 6} + \frac{4^x \cdot \ln 4}{\ln 4} = \\&= 9^x + 2 \cdot 6^x + 4^x = (3^x + 2^x)^2 - \text{верно}.\end{aligned}$$

Приклад 7. Знайти невизначений інтеграл, результат перевірити

диференціюванням: $\int (4 + 3x) \cdot e^{\frac{4x}{3}} dx$.

Розв'язання.

Застосуємо формулу інтегрування за частинами. Нехай $u = 4 + 3x$, а

$$dv = e^{\frac{4x}{3}} dx. \text{ Тоді } \int dv = \int e^{\frac{4x}{3}} dx, \quad v = \frac{3}{4} \int e^{\frac{4x}{3}} d\frac{4x}{3}, \quad v = \frac{3}{4} e^{\frac{4x}{3}} + C.$$

$$\begin{aligned}\int (4 + 3x) \cdot e^{\frac{4x}{3}} dx &= (4 + 3x) \cdot \frac{3}{4} e^{\frac{4x}{3}} - \int \frac{3}{4} e^{\frac{4x}{3}} d(4 + 3x) = \\&= \frac{3}{4} (4 + 3x) e^{\frac{4x}{3}} - \frac{3}{4} \int e^{\frac{4x}{3}} (4 + 3x)' dx = \left(3 + \frac{9x}{4} \right) e^{\frac{4x}{3}} - \frac{3}{4} \int e^{\frac{4x}{3}} \cdot 3 dx = \\&= \left(3 + \frac{9x}{4} \right) e^{\frac{4x}{3}} - \frac{9}{4} \int e^{\frac{4x}{3}} dx = \left(3 + \frac{9x}{4} \right) e^{\frac{4x}{3}} - \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{4} \int e^{\frac{4x}{3}} d\frac{4x}{3} = \\&= \left(3 + \frac{9x}{4} \right) e^{\frac{4x}{3}} - \frac{27}{16} e^{\frac{4x}{3}} + C = \left(3 + \frac{9x}{4} - \frac{27}{16} \right) e^{\frac{4x}{3}} + C = \\&= \left(\frac{9x}{4} + \frac{21}{16} \right) e^{\frac{4x}{3}} + C.\end{aligned}$$

Перевірка:

$$\begin{aligned}\left(\left(\frac{9x}{4} + \frac{21}{16} \right) e^{\frac{4x}{3}} + C \right)' &= \left(\frac{9x}{4} + \frac{21}{16} \right)' e^{\frac{4x}{3}} + \left(\frac{9x}{4} + \frac{21}{16} \right) \cdot \left(e^{\frac{4x}{3}} \right)' = \\&= \frac{9}{4} e^{\frac{4x}{3}} + \left(\frac{9x}{4} + \frac{21}{16} \right) \cdot e^{\frac{4x}{3}} \cdot \frac{4}{3} = \frac{9}{4} e^{\frac{4x}{3}} + \left(3x + \frac{7}{4} \right) \cdot e^{\frac{4x}{3}} =\end{aligned}$$

$$= \left(\frac{9}{4} + 3x + \frac{7}{4} \right) e^{\frac{4x}{3}} = (3x + 4) \cdot e^{\frac{4x}{3}}$$

Приклад виконання завдання за допомогою середовища Mathcad

$$\int \frac{1}{9-x^2} dx \rightarrow \frac{\ln(x+3)}{6} - \frac{\ln(x-3)}{6} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln(x+3)}{6} - \frac{\ln(x-3)}{6} \right) \rightarrow \frac{1}{6 \cdot (x+3)} - \frac{1}{6 \cdot (x-3)}$$

$$\frac{1}{6 \cdot (x+3)} - \frac{1}{6 \cdot (x-3)} \text{ collect} \rightarrow -\frac{1}{x^2-9}$$

$$\int (4 \cdot x^3 + 5 \cdot \cos(x)) dx \rightarrow 5 \cdot \sin(x) + x^4 \quad \frac{d}{dx} (5 \cdot \sin(x) + x^4) \rightarrow 5 \cdot \cos(x) + 4 \cdot x^3$$

$$\int \left[4 \cdot x + \left(\frac{3^x}{2} \right) - \frac{5}{x^2} \right] dx \rightarrow \frac{3^x}{2 \cdot \ln(3)} + \frac{5}{x} + 2 \cdot x^2 \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{3^x}{2 \cdot \ln(3)} + \frac{5}{x} + 2 \cdot x^2 \right) \rightarrow 4 \cdot x - \frac{5}{x^2} + \frac{3^x}{2}$$

$$\int e^{3-4 \cdot x} dx \rightarrow -\frac{e^{3-4 \cdot x}}{4} \quad \frac{d}{dx} -\frac{e^{3-4 \cdot x}}{4} \rightarrow e^{3-4 \cdot x}$$

$$\int \frac{2^{\sin(x)} + x}{\sqrt{1-x^2}} dx \rightarrow \frac{2^{\sin(x)}}{\ln(2)} - \sqrt{1-x^2} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{2^{\sin(x)}}{\ln(2)} - \sqrt{1-x^2} \right) \rightarrow \frac{2^{\sin(x)}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int (3^x + 2^x) dx \rightarrow \frac{2^x}{\ln(2)} + \frac{3^x}{\ln(3)} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{2^x}{\ln(2)} + \frac{3^x}{\ln(3)} \right) \rightarrow 2^x + 3^x$$

$$\int (4 + 3 \cdot x) \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}} dx \rightarrow e^{\frac{4 \cdot x}{3}} \cdot \left(\frac{9 \cdot x}{4} + \frac{21}{16} \right) \quad \frac{d}{dx} \left[e^{\frac{4 \cdot x}{3}} \cdot \left(\frac{9 \cdot x}{4} + \frac{21}{16} \right) \right] \rightarrow \frac{9 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}}}{4} + \frac{4 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}} \cdot \left(\frac{9 \cdot x}{4} + \frac{21}{16} \right)}{3}$$

$$\frac{9 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}}}{4} + \frac{4 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}} \cdot \left(\frac{9 \cdot x}{4} + \frac{21}{16} \right)}{3} \text{ collect} \rightarrow 3 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}} \cdot x + 4 \cdot e^{\frac{4 \cdot x}{3}}$$

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Знайти невизначені інтеграли, результат перевірити диференціюванням:

1. а) $\int \sin \frac{x}{3} dx$;

б) $\int \frac{x + \cos x}{x^2 + 2 \sin x} dx$;

в) $\int \sqrt[3]{2 \sin x - 7 \cos x} dx$;

г) $\int \frac{4x - 5}{x^2 + 5} dx$;

д) $\int x e^{2x} dx$.

2. а) $\int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}}$;

б) $\int \frac{7x - (\arctg x)^3}{1 + x^2} dx$;

- б) $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{16 + 3 \cos x}}$;
 д) $\int x^2 \cos x dx$;
3. а) $\int \frac{dx}{\sin^2(3x - 2)}$;
 б) $\int \frac{\sqrt{\arcsin x}}{\sqrt{1 - x^2}} dx$;
 д) $\int \operatorname{arctg} x dx$.
4. а) $\int \cos(3x + 2) dx$;
 б) $\int \sqrt{x^2 + 16x - 7}(x + 8) dx$;
 д) $\int \ln x dx$.
5. а) $\int e^{\frac{x}{3}} dx$;
 б) $\int 3x^3 e^{2-x^4} dx$;
 д) $\int x^2 \sin x dx$.
6. а) $\int e^{-2x} dx$;
 б) $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg} x}}{1 + x^2} dx$;
 д) $\int x \cdot \ln x dx$.
7. а) $\int 2^{3x-1} dx$;
 б) $\int \sqrt{e^{2x} + 4} \cdot e^{2x} dx$;
 д) $\int \ln^2 x dx$.
8. а) $\int 3^{10x} dx$;
 б) $\int (2x + 5) \sin(x^2 + 5x) dx$;
- г) $\int \frac{xdx}{x^4 + 0.25}$;
 б) $\int \frac{x^2 + \ln x}{x} dx$;
 г) $\int \frac{x + 1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$;
 б) $\int \frac{4x^5 - (\ln x)^3}{x} dx$;
 г) $\int \frac{3x - 4}{x^2 - 4} dx$;
 б) $\int \frac{3 + 7x^4}{x} dx$;
 г) $\int \frac{xdx}{\sqrt{3 - x^4}}$;
 б) $\int \frac{15x}{4 + 9x^2} dx$;
 г) $\int \frac{(\sin x - \cos x)^2}{\sin 2x} dx$;
 б) $\int \frac{7xdx}{6 + 5x^2} dx$;
 г) $\int \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{x} dx$;
 б) $\int \frac{9x}{7 + 3x^2} dx$;
 г) $\int \frac{(x + 1)^2}{\sqrt{x}} dx$;

$$\begin{aligned} & \text{д) } \int \arcsin x dx. \\ 9. \text{ а) } & \int e^{-3x} dx; & \text{б) } & \int (x^2 + 3x - 2)^5 (2x + 3) dx; \\ & \text{в) } \int e^x \sin(1 - e^x) dx; & \text{г) } & \int \frac{2x dx}{x^2 - 100}; \\ & \text{д) } \int 2x \cos 2x dx. \\ 10. \text{ а) } & \int (1 - 2x)^{10} dx; & \text{б) } & \int (x^3 - 6x^2 + 5)(3x^2 - 12x) dx; \\ & \text{в) } \int \frac{\sin x}{1 + 3 \cos x} dx; & \text{г) } & \int \frac{2x dx}{\sqrt{x^2 - 16}}; \\ & \text{д) } \int \frac{\ln x}{x^2} dx. \end{aligned}$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Лабораторне заняття №13.

Кількість годин – 2.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Формула Ньютона-Лейбніца обчислення визначеного інтеграла.
2. Метод підстановки та інтегрування частинами у визначеному інтегралі.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самот. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1993
4. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.
5. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Обчислити визначений інтеграл $\int_1^2 e^x dx$;

Розв'язання.

$$\int_1^2 e^x dx = e^x \Big|_1^2 = e^2 - e$$

Приклад 2. Обчислити визначений інтеграл $\int_2^4 \frac{x^3 + 2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} dx$

Розв'язання.

Під знаком інтеграла неправильний дріб. Застосуємо схему Горнера та отримаємо

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x + 2)(x^2 - 1) + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x + 2)(x^2 - 1)}{x^2 - 1} + \frac{1}{x^2 - 1} = x + 2 + \frac{1}{x^2 - 1},$$

Тоді даний інтеграл можна представити у вигляді

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{x^3 + 2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} dx &= \int_2^4 (x + 2) dx + \int_2^4 \frac{dx}{x^2 - 1} = \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_2^4 + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Big|_2^4 = \\ &= 10 + \frac{1}{2} \ln \frac{9}{5}; \end{aligned}$$

Приклад 3. Обчислити визначений інтеграл $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$

Розв'язання.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x d(\sin x) = \frac{\sin^3 x}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} (\sin^3 \frac{\pi}{2} - \sin^3 0) = \frac{1}{3}.$$

Приклад 4. . Методом заміни змінної обчислити визначений інтеграл:

$$\int_0^{\sqrt{3}} x \sqrt{x^2 + 1} dx$$

Розв'язання.

$$dt = 2x dx, \quad \frac{dt}{2} = x dx$$

Введемо заміну: $t = x^2 + 1$. Тоді

$t = 1$ при $x = 0$ та $t = 4$ при $x = \sqrt{3}$

нові межі інтегрування

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{3}} x\sqrt{x^2+1}dx &= \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{t}dt = \frac{1}{2}\int_1^4 t^{\frac{1}{2}}dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = \frac{1}{3}\sqrt{t^3} \Big|_1^4 = \\ &= \frac{1}{3}(\sqrt{4^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{1}{3}(8-1) = \frac{7}{3};\end{aligned}$$

Приклад 5. . Методом заміни змінної обчислити визначений інтеграл:
Розв'язання.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = t \\ \frac{dx}{x} = dt \\ x=1, t=0 \\ x=e, t=1 \end{array} \right| = \int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1^2 - 0^2) = \frac{1}{2}$$

Приклад 6. Методом заміни змінної обчислити визначений інтеграл:
Розв'язання.

$$\begin{aligned}\int_1^e \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} &= \left| \begin{array}{l} e^x = t \\ e^x dx = dt \\ x=0, t=1 \\ x=1, t=e \end{array} \right| = \int_1^e \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} t \Big|_1^e = \operatorname{arctg} e - \operatorname{arctg} 1 = \\ &= \operatorname{arctg} e - \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

Приклад 7. Використовуючи метод інтегрування за частинами, обчислити визначений інтеграл
Розв'язання.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^0 x e^{2x} dx &= \left| \begin{array}{l} u = x; \quad du = dx \\ dv = e^{2x}; \quad v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{array} \right| = \frac{1}{2} x e^{2x} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} \int_{-1}^0 e^{2x} dx = \\ &= \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{4} e^{2x} \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4e^2} = \frac{3-e}{4e^2}.\end{aligned}$$

Приклад 8. Використовуючи метод інтегрування за частинами, обчислити визначений інтеграл
Розв'язання.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x^2 \cos x dx &= \left| \begin{array}{l} u = x^2; \quad du = 2x dx \\ dv = \cos x dx; \quad v = \sin x \end{array} \right| = x^2 \sin x \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} x \sin x dx = \\ &= -2 \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = x; \quad du = dx \\ dv = \sin x dx; \quad v = -\cos x \end{array} \right| = -2 \left(-x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx \right) = \\ &= -2 \left(-\pi + 0 + \sin x \Big|_0^{\pi} \right) = -2\pi\end{aligned}$$

$$\int_1^2 e^x dx \rightarrow e^2 - e$$

$$\int_2^4 \frac{x^3 + 2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} dx \rightarrow \ln(3) - \frac{\ln(5)}{2} + 10$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^2 \cdot \cos(x) dx \rightarrow \frac{1}{3}$$




$$\int_0^{\sqrt{3}} x \sqrt{x^2 + 1} dx \rightarrow \frac{7}{3}$$

$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e \frac{e^x}{1 + e^{2-x}} dx \rightarrow \operatorname{atan}(e^e) - \operatorname{atan}(e)$$

$$\int_{-1}^0 x \cdot e^{2-x} dx \rightarrow \frac{3 \cdot e^{-2}}{4} - \frac{1}{4}$$

$$\int_0^{\pi} x^2 \cdot \cos(x) dx \rightarrow -2 \cdot \pi$$



Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Обчислити визначений інтеграл методом заміни змінної.

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx.$
2. $\int_0^8 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x}}.$
3. $\int_0^e \frac{dx}{x(1 + \ln x)}.$
4. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}.$
5. $\int_1^e \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}.$
6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx.$
7. $\int_1^e \frac{\sqrt{1 - \ln x}}{x} dx.$
8. $\int_4^9 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}.$
9. $\int_1^e \sin^3 x dx$
10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos x}.$

Обчислити інтеграл за формулою Ньютона-Лейбніца.

1. $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{4 dx}{x^2 + 5}$
2. $\int_{-3}^0 \frac{3 dx}{\sqrt{25 + 5x}}$
3. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{7 dx}{4 \sin^2 3x}$
4. $\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5 + 4x - x^2}}$
5. $\int_{-\pi}^{\pi} 3 \sin \frac{x}{2} dx$
6. $\int_3^8 \sqrt{x+1} dx$
7. $\int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} 12 \operatorname{ctg} 3x dx$
8. $\int_0^1 \frac{2 dx}{\sqrt{4 - 3x}}$
9. $\int_{-1}^0 \frac{dx}{4x^2 - 9}$
10. $\int_1^e \left(3 + \frac{2}{x}\right) dx$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Лабораторне заняття №14-15.

Кількість годин – 4.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Обчислення площі криволінійної трапеції.
2. Обчислення об'єму тіла обертання.
3. Обчислення довжини дуги.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану
3. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.: Высшая школа, 2000. Ч.1 - 304 с; Ч.2 – 360 с.
5. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993
6. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. – М.: Рольф, 2002. – 288 с., с ил.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями: $y = (x-1)^2$, $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Розв'язання.

Знайдемо точки перетину даних ліній:


$$x^2 - \frac{(x-1)^4}{2} = 1, \text{ або } x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Розв'язуємо отримане рівняння: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ и $y_1 = 0$, $y_2 = 4$.

Таким чином, криві перетинаються у точках $A(1; 0)$ и $B(3; 4)$. Тоді

$$S = \int_1^3 [\sqrt{2(x^2 - 1)} - (x - 1)^2] dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[x\sqrt{x^2 - 1} + \ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| \right]_1^3 - \frac{1}{3} [(x - 1)^3]_1^3 =$$


$$= \frac{\sqrt{2}}{2} [3\sqrt{8} + \ln(3 + \sqrt{8})] - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(3 + \sqrt{8}) \approx 4,58 \text{ (кв. ед.)}$$



Приклад 2. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями

$$y = -x^2 + 4x + 5 \text{ та } y = 2x - 3.$$

Розв'язання.



Побудуємо фігуру, обмежену параболою $y = -x^2 + 4x + 5$ (l_1) та прямою $y = 2x - 3$ (l_2) на координатній площині; при цьому знаходимо точки перетину заданих ліній між собою.

$$\begin{cases} y = -x^2 + 4x + 5 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 3 \\ x^2 - 2x - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 3 \\ x = 4 \\ x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \\ x = -2 \\ y = -7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M_1(4; 5) \\ M_2(-2; -7) \end{cases}$$

Точка $M_8(2; 9)$ — вершина параболу $y - 9 = -(x - 2)^2$.

Площа S фігури $M_1M_8M_2$ буде така:


$$S = \int_{-2}^4 (-x^2 + 4x + 5 - (2x - 3)) dx = \int_{-2}^4 (-x^2 + 2x + 8) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + x^2 + 8x \right) \Big|_{-2}^4 =$$

$$= -\frac{64}{3} + 16 + 32 - \left(\frac{8}{3} + 4 - 16 \right) = 36.$$

Приклад 3. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ox фігури, обмеженої лініями $y^2 = 3x - 3$, $x = 1$, $x = 4$.

Розв'язання.

У прямокутній системі координат будуюмо фігуру, обмежену даними лініями.



За формулою $V_x = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$ об'єм тіла буде таким:

$$V = \pi \int_1^4 y^2 dx = \pi \int_1^4 (3x - 3) dx = \frac{3\pi}{2} (x - 1)^2 \Big|_1^4 = \frac{27}{2} \pi.$$


Приклад 4. Знайти площу фігури, обмежену лініями $y = (x - 2)^2$ $y = x$.

Розв'язання.

Знайдемо точки перетину даних ліній

$$\begin{cases} y = (x - 2)^2, \\ y = x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (x - 2)^2, \\ y = x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ y = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1, & x_2 = 4; \\ y_1 = 1, & y_2 = 4. \end{cases}$$

У прямокутній системі координат будуюмо фігуру, обмежену даними лініями.




$$S = \int_1^4 (x - (x-2)^2) dx = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right) \Big|_1^4 =$$

$$= \left(-\frac{4^3}{3} + \frac{5 \cdot 4^2}{2} - 4 \cdot 4 \right) - \left(-\frac{1^3}{3} + \frac{5 \cdot 1^2}{2} - 4 \cdot 1 \right) = \frac{9}{2}.$$

Приклад 5. Знайти площу плоскої фігури, обмеженої кардіоїдою
 $\rho = 2(1 + \cos \varphi)$.

Розв'язання.



$$S = \int_0^{2\pi} \rho^2(\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2(1 + \cos \varphi))^2 d\varphi =$$

$$= \frac{1}{2} 4 \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi)^2 d\varphi =$$

$$= \frac{1}{2} 4 \int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi =$$

$$= 2 \cdot \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} + 2\cos \varphi + \frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) d\varphi =$$

$$= 2 \left(\frac{3}{2} \varphi + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 2 \left(\frac{3}{2} \cdot 2\pi + 2\sin 2\pi + \frac{1}{4} \sin 4\pi - \left(\frac{3}{2} \cdot 0 + 2\sin 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) \right) = 6 \cdot \pi.$$

Приклад 6. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох
 косинусоїд в межах від $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ до $\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Розв'язання.

Скористаємося

формулою

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx, \quad \text{де}$$

$$f(x) = \cos x, \quad a = -\frac{\pi}{2}, \quad b = \frac{\pi}{2}.$$

$$V = \pi \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \cdot dx = \pi \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx = \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2x) dx =$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi - \left(-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin(-\pi) \right) \right) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{2}.$$

Приклад 7. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями:

$$x=0; x=2; y=2^x; y=2x-x^2$$

Розв'язання.

Так як $y_1 > y_2$ при усіх значеннях $x \in [0; 2]$, то


$$S = \int_0^2 (2^x dx - (2x - x^2)) dx = \frac{3}{\ln 2} - \frac{4}{3}$$

Приклад 8. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями: :

$$y_1 = x+1, y_2 = \cos x; y=0.$$

Розв'язання:

У прямокутній системі координат будуюмо фігуру, обмежену даними лініями.




$$S = S_1 + S_2 = \int_{-1}^0 (x+1) dx + \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \frac{3}{2}$$

Приклад 9. Обчислити площу фігури, обмежену лініями: $\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3 \end{cases}$, прямою $y = 1$ та віссю Oy .

Розв'язання.

Побудуємо графіки даних функцій. Так як одна з ліній задана параметрично, то надаючи параметру довільні значення, складемо таблицю значень функцій.

t	-2	-1	0	1	2
x	4	1	0	1	4
y	-8	-1	0	1	8



Таким чином, вважаючи $\begin{cases} y(t) = t^3, \\ x(t) = t^2 \end{cases}$ знайдемо $x'(t) = 2t$,

підставимо знайдені вирази в формулу, попередньо обчисливши межі інтегрування по t :

$$x = 0 \Rightarrow 0 = t^2 \Rightarrow t_1 = 0$$

(у нашому випадку $t_1 = \alpha$).

$$x = 1 \Rightarrow 1 = t^2 \Rightarrow t_2 = \pm 1$$

(у нашому випадку $t_2 = 1 = \beta$).

Тоді $S_\phi = S_{\text{кв.}} - S_1$, так як $S_{\text{кв.}} = 1$ кв. од.;

$$S_1 = \left| \int_0^1 y(t) \cdot x'(t) dt \right| = \left| \int_0^1 t^3 \cdot 2t \cdot dt \right| = 2 \left| \int_0^1 t^4 dt \right| = 2 \left| \frac{t^5}{5} \right|_0^1 = 2 \cdot \left| \frac{1}{5} \right| = \frac{2}{5} \text{ (кв. од.)}.$$

$$S_\phi = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \text{ кв. ед.}$$

Приклад 10. Обчислити довжину дуги кривої, заданої рівнянням $y = \frac{1}{3} x \cdot \sqrt{x}$ від початку координат до точки $B(12; 8 \cdot \sqrt{3})$.

Розв'язання.

Знайдемо похідну функції $y = f(x) = 1/3 \cdot x \cdot \sqrt{x}$, тобто

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3} \cdot x \cdot \sqrt{x} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \left(x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{2};$$


т. як. $O(0; 0)$, $B(12; 8 \cdot \sqrt{3}) \Rightarrow$ у нашому випадку $a = 0$; $b = 12$.

$$\begin{aligned} \alpha_{\text{об}} &= \int_0^{12} \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^2} dx = \int_0^{12} \sqrt{1 + \frac{x}{4}} dx = \int_0^{12} \left(1 + \frac{x}{4} \right)^{1/2} dx = \\ &= 4 \cdot \int_0^{12} \left(1 + \frac{x}{4} \right)^{1/2} d \left(1 + \frac{x}{4} \right) = 4 \cdot \frac{\left(1 + \frac{x}{4} \right)^{3/2}}{3/2} \bigg|_0^{12} = \\ &= \frac{8}{3} \cdot \left(1 + \frac{x}{4} \right) \bigg|_0^{12} = \frac{8}{3} \cdot (1 + 3) \cdot \sqrt{1 + 3} - \frac{8}{3} \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = \frac{8}{3} \cdot 4 \cdot 2 - \frac{8}{3} = \frac{64}{3} - \frac{8}{3} = \frac{56}{3}. \end{aligned}$$


Приклад виконання завдання за допомогою середовища Mathcad

$$y1(x) := -x^2 + 4 \cdot x + 5$$

$$y2(x) := 2 \cdot x - 3$$





$$y(x) := \sqrt{3 \cdot x - 3}$$



$$y1(x) = y2(x) \text{ solve, } x \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S := \int_{-2}^4 (y1(x) - y2(x)) dx$$


$$S = 36$$



$$Vx := \pi \cdot \int_1^4 (y(x))^2 dx$$


$$Vx = 42.412$$

$$Vx \rightarrow \frac{27 \cdot \pi}{2}$$



$$y1(x) := (x - 2)^2$$

$$y2(x) := x$$




$$y1(x) = y2(x) \text{ solve, } x \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S := \int_1^4 (y2(x) - y1(x)) \, dx$$

$$S = 4.5$$

$$\rho(\varphi) := 2 \cdot (1 + \cos(\varphi))$$



$$S := \left[\int_0^\pi (\rho(\varphi))^2 \, d\varphi \right]$$

$$S = 18.85$$

$$S \rightarrow 6 \cdot \pi$$


$$V_x := \pi \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (f(x))^2 \, dx$$

$$V_x = 4.935$$

$$V_x \rightarrow \frac{\pi^2}{2}$$

$$V := \pi \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x))^2 dx \rightarrow \frac{\pi^2}{2}$$

$$y1(x) := x + 1 \quad y2(x) := \cos(x) \quad y3(x) := 0$$



Given

$$y1(x) = y2(x)$$

$$Y := \text{Find}(x) \rightarrow 0$$

Given

$$y1(x) = y3(x)$$

$$Y1 := \text{Find}(x) \rightarrow -1$$

Given

$$y2(x) = y3(x)$$

$$Y2(x) := \text{Find}(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$S := \int_{-1}^0 y1(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} y2(x) dx$$


$$S \rightarrow \frac{3}{2}$$

$$y(t) := t^3 \quad x(t) := t^2$$

Given

$$y(t) = x(t)$$

$$T := \text{Find}(t) \rightarrow (0 \ 0 \ 1)$$



$$x1(t) := \frac{d}{dt} x(t)$$

$$S := \left| \int_0^1 y(t) \cdot x1(t) dt \right|$$

$$S = 0.4$$

$$Sf := 1 - S \quad Sf = 0.6$$

$$y(x) := \frac{x \cdot \sqrt{x}}{3} \quad +$$

$$y1(x) := \frac{d}{dx} y(x) \rightarrow \frac{\sqrt{x}}{2}$$

$$\alpha := \int_0^{12} \sqrt{1 + y1(x)^2} dx$$

$$\alpha \rightarrow \frac{56}{3}$$

Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

1. Обчислити площу фігури обмеженої лініями.

2. Визначити об'єм тіла, утвореного обертанням фігури, обмеженої заданими лініями навколо осі ox (V_{ox}) та навколо осі oy (V_{oy}).

Варіант 1

1. $y = -x^2 + 4x - 1$; $y = -x - 1$.

2. $y = x - 2$; $\frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$; $y = 0$.

Варіант 2

1. $y = x^2 + 3x + 2$; $y = 5x + 2$.

2. $y = 2x - x^2$; $y = x$.

Варіант 3

1. $y = -x^2 + 6x - 5$; $y = x - 5$.

2. $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$.

Варіант 4

1. $y = -x^2 + 7x + 3$; $y = 3 - x$.

2. $y = -x^2 + 8$; $y = x^2$.

Варіант 5

1. $y = -x^2 + 4$; $x + 2y + 1 = 0$.

2. $y = 2x^2 - 4x$; $y = 0$.

Варіант 6

1. $y = x^2 + 6x + 7$; $y = x + 7$.

2. $y = -2x$; $\frac{x}{-3} + \frac{y}{3} = 1$; $y = 0$.

Варіант 7

1. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$; $y = \frac{x^2}{2}$.

2. $y = 3x^2 - 30x$; $y = 0$.

Варіант 8

1. $y = x^3$; $y = 4x$

2. $y = -2x$; $\frac{x}{-4} + \frac{y}{8} = 1$; $y = 0$.

Варіант 9

1. $y = -x^2 - 6x - 5$; $y = -x - 5$.

2. $y = 2x - x^2$; $y = x$.

Варіант 10

$$1. y = \frac{2}{x^2 + 1}; \quad y = x^2.$$

$$2. y = x^2 - 4x; \quad y = 0.$$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

Лабораторне заняття №16.

Кількість годин – 2.

Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування.
2. Невласні інтеграли від обмежених функцій.

Література, методичне та матеріально – технічне забезпечення занять:

1. Конспект лекцій.
2. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану
3. Вища математика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.: Высшая школа, 2000. Ч.1 - 304 с; Ч.2 – 360 с.
5. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993
6. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 1 часть. – М.: Рольф, 2002. – 288 с., с ил.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач вищої освіти забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до мережі Internet). Методичне забезпечення надаються в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Здобувачі вищої освіти виконують завдання згідно методичних вказівок до теми заняття. Розібрати розв'язання типового прикладу. За аналогією розв'язати приклади самостійно зі свого варіанту (номер варіанту – номер здобувача у журналі групи). Отриманий результат перевірити у Mathcad. Оформити звіт, який повинен містити вихідні данні, розв'язання прикладу та перевірку відповіді, отриману у Mathcad.

Приклад 1. Обчислити невластний інтеграл або встановити його розбіжність

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

Розв'язання.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg x \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctg b - \arctg 0) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg b = \frac{\pi}{2}$$

- інтеграл збіжний і дорівнює $\pi/2$

Приклад 2. Обчислити невластний інтеграл або встановити його розбіжність

$$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x}$$

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \int_e^{\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_e^b \frac{dx}{x \ln^3 x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_e^b \frac{d(\ln x)}{\ln^3 x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_e^b \ln^{-3} x \, d(\ln x) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{-2} x}{-2} \Big|_e^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2 \ln^2 x} \Big|_e^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{2 \ln^2 b} - \frac{-1}{2 \ln^2 e} \right) = \left(\frac{-1}{2 \ln^2 \infty} + \frac{1}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{\infty} + \frac{1}{2} \right) = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- інтеграл збіжний і дорівнює $1/2$

Приклад 3. Обчислити невластний інтеграл або встановити його розбіжність

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx$$

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx &= \int_{-\infty}^0 e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{-x} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-e^{-x} \right) \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-e^{-x} \right) \Big|_0^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-e^0 + e^{-a} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-e^{-b} + e^0 \right) = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-e^0 + \frac{1}{e^a} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{e^b} + e^0 \right) = (-1 + \infty) + \left(-\frac{1}{\infty} + 1 \right) = \infty - \text{інтеграл розбіжний} \end{aligned}$$

Приклад 4. Обчислити невластний інтеграл або встановити його розбіжність

$$\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln x}}$$

Розв'язання.

Інтеграл $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln x}}$ - невластний інтеграл другого роду, підінтегральна функція

$\frac{1}{x \sqrt[3]{\ln x}}$ не існує в т. $x = 1$ ($\ln 1 = 0$). Тоді,

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln x}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{1+\varepsilon}^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{1+\varepsilon}^e \frac{d(\ln x)}{\sqrt[3]{\ln x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{1+\varepsilon}^e (\ln x)^{-\frac{1}{3}} d(\ln x) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{3(\ln x)^{\frac{2}{3}}}{2} \Big|_{1+\varepsilon}^e = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{3 \sqrt[3]{(\ln x)^2}}{2} \Big|_{1+\varepsilon}^e = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\frac{3 \sqrt[3]{(\ln e)^2}}{2} - \frac{3 \sqrt[3]{(\ln(1+\varepsilon))^2}}{2} \right) = \\ &= \frac{3 \sqrt[3]{1}}{2} - \frac{3 \sqrt[3]{(\ln 1)^2}}{2} = \frac{3}{2} - 0 = \frac{3}{2} - \text{інтеграл збіжний і дорівнює } 3/2 \end{aligned}$$

Приклад 5. Обчислити невластний інтеграл або встановити його розбіжність


$$\int_{-1}^0 \frac{2+3x^2}{\sqrt[3]{x^8}} dx$$

Розв'язання.

Даний інтеграл – невластний інтеграл другого роду.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{2+3x^2}{\sqrt[3]{x^8}} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-1}^{0-\varepsilon} \frac{2+3x^2}{\sqrt[3]{x^8}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-1}^{-\varepsilon} (2x^{-\frac{8}{3}} + 3x^{-\frac{2}{3}}) dx = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(-\frac{2 \cdot 3x^{-\frac{5}{3}}}{5} + \frac{3 \cdot 3x^{\frac{1}{3}}}{1} \right) \Big|_{-1}^{-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(-\frac{6}{5 \sqrt[3]{x^5}} + 9 \sqrt[3]{x} \right) \Big|_{-1}^{-\varepsilon} = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\frac{6}{5 \sqrt[3]{\varepsilon^5}} + \frac{6}{5} - 9 \sqrt[3]{\varepsilon} + 9 \right) = \frac{6}{5 \sqrt[3]{0}} + \frac{6}{5} - 9 \sqrt[3]{0} + 9 = \infty + \frac{6}{5} + 9 = \infty \\ &- \text{інтеграл розбіжний.} \end{aligned}$$

Приклад виконання завдання за допомогою середовища Mathcad



Варіанти завдань для самостійного розв'язання.

Обчислити невідкладні інтеграли:

1. $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$
2. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$
3. $\int_0^1 \frac{dx}{x \ln x}$
4. $\int_0^3 \frac{dx}{(x-3)^2}$
5. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x dx}{x^2}$
6. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x^4}$
7. $\int_2^{+\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^4 + 1}}$
8. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$
9. $\int_1^{+\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^6 + 2}}$
10. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2 - 1}$

III. Заключна частина заняття.

Для перевірки результатів роботи здобувачі вищої освіти надають звіт з результатами роботи. Оголошення теми наступного заняття.

3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна література.

1. Єрмакова О. А. Вища математика: Навч. посіб. для дистанц. Форми навчання / За ред. В. М. Назаренка. – К.: Ун-т «Укрвіна», 2004. – 444 с.
2. Колодінська О.В. Вища математика у прикладах і задачах. Навчальний

посібник.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.

3. Конспект лекцій по курсу "Высшая математика", часть 1 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"/ Боцюра О.А., Гнусов Ю.В., Шеховцов С.Б. – Харьков: ХНУВД, 2007. – 62 с.

4. Лавренчук В. П., Готинчан Т. І., Дронь В. С., Кондур О. С. Вища математика. Курс лекцій у трьох частинах. Частина 1: Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 440 с.

5. Мелашенко, О. П. Вища математика: навч. посіб. / О. П. Мелашенко, В. Є. Рог; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с.

6. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д. Алгебра та геометрія для економістів. – К.:УФІМБ “Пошук”, 1998.

7. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» : [галузь знань: Інформаційні технології; спец.: Кібербезпека; спец.: протидія кіберзлочинності; ступінь вищ. освіти: бакалавр; форма навчання: денна] / розроб. Ю.В. Гнусов. - Харків : ХНУВС. - 2016. - 14 с.

8. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: Высшая школа, 1989. – 679 с.

Допоміжна література.

1. Вища математика: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, О. І. Лютий та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 606 с.

2. Чубатюк В. М. Вища математика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів III та IV рівнів акредитації. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 432 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Вища математика: Підручник / Домбровський В.А., Крижанівський І.М., Мацьків Р.С., Мигович Ф.М., Неміш В.М., Окрепкий Б.С., Хома Г.П., Шелестовська М.Я.; за редакцією Шинкарика М.І. –Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2003 - 480с. - ISBN 966-7946-15-0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/matematica/VM_pidr.pdf. - Назва з екрану.

2. Вища математика. Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/148/Basmanov.pdf - Назва з екрану.

Рубіш В.В. Конспект лекцій з курсу "Вища математика": Частина І. – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015. – 96 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3472/1/Methodychka_VM_Phys.pdf